IL MEDICO DI SE STESSO

NEL

MAL YEREREO

LEZIONI

di Oreste Giammaria

DOTT. IN MED. E CHIRUR.



TIPOGRAFIA DI RIETPLLI Diretta da la Rocca.

1833.

Si cho rem perages, usus fiat langior.

The first of a summary summer of the summer

PREFAZIONE

EL dar compimento al corso delle mie particolari lezioni di chirurgia teoretica, per secondare le brame de' valenti giovani miei discepoli, ho dovuto in quest' anno, e dentro il mese di agosto, dettare le malattie venerce, agevolandone lo studio con un picciolo ristretto. Questo, benchè povero, non ostante la sua brevità, essendo riuscito molto utile al loro ammaestramento, mi fa credere esser cosa utilissima il metterlo alle stampe, ed indirizzarlo a tutti coloro che ammalati per la venere, bramano medicarsi da loro, senza l'aiuto del medico. E mi dovranno esser grati, specialmente tutti quei giovani che per timidezza, o per mal diretta loro educazione, nascondono il proprio male sdegnando farsi osservare dal medico. Quanti giovani son periti per non aver chiesto consiglio al medico ammalati di sifflide! quanti altri han risentito sino

4 alla morte le conseguenze di tale malattia, perchè troppo tardi domandarono soccorso al medico?

Siate pur timidi; siate pur segreti nei vostri mali venerei; sdegnate pure il consiglio de' medici, che qui troverete, giovani inesperti, i rimedi per guarirvi: è perciò che a voi io intendo parlare, e dirigere questo mio tenue lavoro, ai medici non già; ne parlar posso con dottrina, non mi comprendereste in tal guisa; spero usar termini del tutto conosciuti, e che non possono avere altra interpetrazione.

Così mi renderò utile a voi, unico scopo dalla mia determinazione.

The committee of the first of and one of the first of an and of the first of



BRÉVI NOTIZIE

SULL'ORIGINE DEL MAL VENEREO

Le differenti specie del mal venereo van chiamate col nome di sifilide (1), che significa amore da porco, amor laido, malattia da coito impuro. Altri dissero sifilide un tal male, dal perchè Sifilo pastore, fu il primo a patirne.

La sifliide è ventta a noi dall'America (tale è l'opinione di Girtanner) (a). I compagni di Colombo nelmarzo 1493, reduci dalle Antille che avevano scoverte, ziportarono un male molto comune fra gli abitanti di quelle isole, il quale consisteva in uno sfogo per tutto il corpo, chiamato da selvaggi caracaraco. Gli spagnuoli vi erano rimasti infetti per mezzo delle voluttuose donne indiane. Coù ri portò nella Spagna. Carlo VIII

⁽¹⁾ Vocabolo derivato dalle due greche parole sis porco, e filia amoro.

⁽a) Intorno l' origine del mal venereo v'ebbero tre opinioni principilmente : alemi il tenereo per antico come Cocchi, lenster ; Malscarne ; Bell ; Calvi ; Sanches ee. Altri come Sidenham, Berahave ; Swediaur perasruone che sia venuto dall' Africa. Finalmente la terza, più generalmente ammossa; si o che sia pervenuto dall' America.

re di Francia volcudo rimpadronirsi del bel regno di Napoli, si recò nelle nostre vicinanze con poderosa armata. Ma Ferdinando II chiedendo soccorso dal re di Spagna suo congiunto, quando ebbe rinforzata l'armata sua con escreito considerevole staccato dall'isola di Sicilia, ben si oppose con decisa superiorità al nemico. I Francesi nel seguente anno 1495, vinti, si restituirono in Francia.

Ora nell'armata spagnuola vi erano moltissimi già infetti dalla sifilide o presa in America, o nella Spagna, e comunicata l'aveano alle meretrici italiane. Queste siccome promiscuamente offrivano i loro servigi agli spagnuoli, ai francesi, ed agli italiani, così la malattia in poco tempo si rese universale tanto tra l'esercito francese, che italiano.

Da ciò si dettero diverse denominazioni al male. I francesi si credettero esser rimasti infetti dalle donne napolitane, perciò dissero il male, male napolitano, Gl' italiani al contrario, nulla supponendo che loro si fusse portato dagli spagnuoli, il dissero mal francese. È cosa facile l'immaginare come dovesse l'infezione propagarsi rapidamente per tutta la Francia. E perchè l'armata francese, soccorsa era dalle truppe tedesche, così queste condussero il male tra gli svizzeri, e nella Germania. Gli spagnuoli il diffusero nel Portogallo, ne' Paesi Bassi, e nell' Africa, ed i francesi medesimi lo recarono nella Scozia, e di là nell'Inghilterra : i portoghesi nelle Indie Orientali, ove si disse mal portoghese. I turchi lo dissero mal de' cristiani , i persiani de' turchi; i moscoviti de' polacchi. I Santi invocati per la guarigione del male, vi dettero purc il nome;

così si disse male di S. Mevio, di S. Rocco, di S. Elagrio, di Giobbe ec. (1).

Fu detto in ultimo da Fracastoro sifilide dal perchè Sifito pastore della gregge di Alcitoo sovrano dell' Atlantide, lasso un giorno di sostenere i raggi del sole, per parte anche del gregge, ardi insultare il sole medesimo, negando di più sacrificare a lui qual comun padre e Nume. Ad Alcitoo suo re, Sifilo invece insleto attari, ed arse incensi, e lui imitarono gli altri pastori e villani (3).

Ma come nacque tra gli americani? La domanda à naturale, ma non à facile a darvi risposta adeguata: Le congesture acutissime di Gistanicer meritano qual-che luogo. Gli abitanti del nuovo mondo debolic senza barba, poco inclinati al coito, dovendo secondare le brame delle voluttuose donne americane, erano soli leticati a quest' atto in diversi modi dalle stesse donne rese ingegnose all'oggetto. Fra questi uno vé n' era affatto inaudito, che ci è raccontato da Americo Vespuoci come testimonio di vista: consisteva in un piccolo insetto velenoso ch' esse applicavano sul membro dei

⁽¹⁾ Chomet, Ternel, e Bethencourf lo dissero venereo; Augerio Ferrario, Antonio Locy luc ispanica. Bernardo Tomitana morbo malæ veneris.

⁽²⁾ Dopo di che prosegue il narratore americano

Primus, regi qui sanguine fuso Instituit divinas, sacrasque in montibus aras Syphilus, otendit turpes per corpus achores, Insomuus primus moctes, comudaque membras Sornut, et a primo traxit cognomina morbus Syphilidenque, ab eo labem dixere coloni.

loro mariti affinchò ne venissero eccitati al coito; da quel morso spesso nascevano ulcere maligne, anche infiammazioni e cangrena al membro: così l'ulcera si comunicava anche a loro, ed il male si diffondeva (1).

MEZZI PEI QUALI IL MAG PENEREO

Generalmente si crede che il mal venereo si comuni-

chi soltanto per mezzo del coito; ma questo è un errore, Non vi è dubio che il coito è uno de' principali mezzi, ma altri ve ne sono, atti pur essi a comunicar l'inne fecione, onde ne facciamo la seguente enumerazione. 1.

1. Per mezzo del coito: possono verificarsi in questo caso due ciroostanze: o che la persona che si coisce ha nelle parti genitali un'infezione venerea, o le parti genitali medesime, sane in apparenza, nascondand in loro del veleno ivi depositato da un preceduto coito impuro. Può in questo caso la donna o l'uomo comunicar l'infezione e rimanerne privi (2).

⁽¹⁾ Nulla si ad ip seciso sull'origina del mal venerco. Ciò che abbiam ripettuto serve per appagare i curiosi. L'autoriti di nulti scrittori ci fa credore che lo stesso sia esistito da tempo immenonchile. Coda si accoga nui diversi passa tratti dal Levittor, libro di Mosè, nulle opere d'Ippocrate, di Erodoto, di Calso, di Giorcande, di Discordite, di Plinio filgiori con la companio del proposito del pr

⁽²⁾ Da ciò si spiega come di più individui che coiscono una donna, il primo tante volte rimane infetto, e gli altri uo, e la donna assoggettata alla visita si trova pulita.

3. Per mezzo di ferite t. le parti ferite per mezzo di un'istrumento qualunque, tostoschè vanno a contatto del veleno sifilitico ne lo assorbisono facilmente e ben prestó si vergono sviluppare periodosi accidenti (1).

4. Per mezzo de bacit, qulle persone che hanno ulcero sissitiche celle labbra, o nella bocca, hanno la saliva carica di umor contagioso, e perciò ne baci facilmente complimentano persone sane. Così può comunicarsi egualmente col cambiare, i, bicchieri.

5. Per mezzo della generazione: innegabili esperienze dimostrano che figli rati da genitori infetti di sifilide, risentono i danni di un tal malore in diversi modi, o nell'attraversare nel parto, l'apparato sessuale, già infetto di sifilide, restano contagiati.

 Per mezzo delle vesti: se una persona indossasse de'calzoni o camice lorde di materia venerea e di scabbia facilmente riman contagiata.

Questi diversi mezzi di comunicazione riescono più o meno efficaci, secondo alcune particolari circostanze.

collected the state

⁽¹⁾ Nos zon poche lo osseriazioni de' jactici all' oggetto Presso dell'Hunter e di altri si leggono i tristi effetti segutti a tales specie di sissorbimenti, presso specialamente i chirurgi che nell' aprire buboni ssifilitici, o cadaveri infetti di tal male, anche nel o operationi di parto, forti in qualche dilo, contrassero la siliude. Per opera di tal mezes si è commicata la ssifilide dall' Papplicazione delle mignatter, questo attacache procedientemente a persona stifilitica , han depositato il veleno a quegli che se l'obbre applicate la seconda volta.

Coù la maggiore o minore irritabilità del corpo, specialmente nell'istante del coito, influisce grandemente sull'assorbimento del releno. Le persone deboli, quello che usano in tempo di ubriachezza, che ripetono più di frequente quest'atto, e che non usano una gran polizia dopo lo stesso, son più volentieri attaccate (1).

Premesse tali brevi notizie sulla propagazione della sifilide, entriamo alla desorizione particolare delle diverse malattie veneree, dividendole in locali, e generali.

MALATTIE LOCALI

CAPO PRIMO

Della Scolazione

Col nome di scolazione intendete qui quella malattia che i medici chiamano bleunorragia (2). Questa parola significa scolo di mucosti senza indicare la causa o la sede particolare del male, e perciò potrebbe addirsi a tutte le sècrezioni morbose delle membrane mucose, sieno infiammate oppur no. Dopo Swediaur la voce blennorragia è stata consagrata ad indicare gli scoli in vario grado infiammatori del cassale dell' uretra o del glande, e del prepuzio dell' uomo, e della vagina, e dell' ureca.

⁽¹⁾ Da ciò si spiega il perchè di varj individui che ebbero commercio con donna infetta, alcani riportarono danni maggiori degli altri.

⁽²⁾ Vocabolo derivato dalle due greche parole blenna muco, e rago rompere, zampillare, fluire.

tra della donna (1). Questi scoli possono derivare da cagioni tanto esterne, che interne. Le cagioni esterne possono essere 1. La presenza di qualche corpo estraneo. 2. Le infezioni irritanti. 3. L' equitazione. 4. La mastrupazione. 5. Il coito effettuito nella mestruazione on onella leucorrea (2). 6. La sua ripetizione con donna sana. 7. La marcia segregata dalle piaghe dell'utero. 8. L'applicazione del contagio venerco, e possiamo aggiungere. 9. Il cambiamento di temperatura da calda, a fredda ed umida:

Fra le cagioni interne si annoverano, la riténzione dell'urina, l'enfiagioni della prostata (3), la presenza di una pietra nella vessica urinaria, de vermi negl'intestini, l'uso delle cantarelle, quello della birra rocente; la dentizione difficile, gli emorroidi, l'erpete, la rogna, la podagra, il reuma, le scrofole, e l'esistenza dell'umor sifitico nella massa del sanue.

Perchè la scolazione può esser prodotta da tante e sì differenti cegioni , è stata suddivisa in diverse specie : così si è distinta i venerea, in lebbrosa, in artificiale , in erpetica , in gottosa , in simpatica , in quella che segunta alla lue venerea (4) ec. Quì non si paria che della

resummer Creekle

⁽a) Il glande ò l'estremità del membro, altrimonti delte de copo del membro. Il prepuzio ri il prolongamento della pelle del membro che ricopre più o meno, il glande. La vagina è un cuale, membranose che delle grandi labbra, mena all'utero. L'ucetra più è anche cemale sua stretto che dalla vessica urinaria si apre all'esterio per espellere l'inrina.

⁽²⁾ È lo scolo mucoso per le parti genitali della donna.

3. Ea prostata è un corpo glandraloso sitnato davanti il coldo della vessica urinaria che abboaccia una porzione dell' aretra.

(4) Questa lue è l'infesione del sangue derivata dall'assorbimento del veleno venero».

sola blennorragia venerea, la di cui cura poco differisce dalle altre. Vi descriverò in primo luogo la blennorragia dell'uomo, ed indi guella della donna.

Si appalesa comunemente la blennorragia contagiosa dal secondo, sino all'ottavo giorno dacchè si ebbe commercio con donna infetta: talvolta non comparisce se non dopo 15 giorni, od anche un mese; si vide pure principiare subito dopo il coito. Il primo indizio che l'anminzia consiste in certa sensazione di solletico, e di stringimento nella estremità della verga, dapprima così lieve da esser piuttosto piacevole che penosa; e da indurre assai volte maggiori bramosie del consueto; tale mite eccitamento cresce quindi in modo progressivo fin a diventare, verso il secondo o terzo giorno, un cociore incomodissimo ; rosseggia allora l'apertura dell' estremità del membro, si gonfia, le sue labbra mostransi accollate da certa mucosità poco consistente ; si danno a sentire frequenti bisogni di urinare, ed ogni volta che il malato vi soddisfa, si aumenta il suo dolore, che in seguito diventa ardente e quasi intollerabile. Dal sesto all'ottavo giorno circa , lo scolo si fa più copioso, si addensa, diventa opaco quanto il latte, poi si colorisce in giallo e in verde. Aggravasi allora l'infiammazione fino al duodecimo, decimoquinto, o al vigesimo giorno, secondo la diversa costituzione dell'individuo e la qualità della cura alla quale si assoggettò. D' allora in poi manca l'infiammazione, scema lo scolo, di verde che era risulta giallo, poi bianco, più viscoso, indi svanisce più o men presto. Non curata, di rado cessa prima di un mese, o di 40 giorni.

Vi guarirete dalla blennorragia col prescrivervi nel

principio parecchie bevande diluenti e mueilagginose atte a moderare l'infiammazione. Fate uso perciò dei decoti leggeri de semi di lino, di canape, di orzo, di radice di saponaria, di altea, di gramigna; dei brodi di vitello, o di pollo: usate la soluzione di gomma arabica, la emulsione di mandorle, il siero ec. addoleite con lo sciroppo di orzata, di altea, o di capil-venere: di tali decozioni prendetene 3 in 4 libre al giorno con 1a sino a 20 granelli di nitro puro. Usate il cibo vegetabile, la quiete: lungi da voi il ballo, la corsa, l'equitazione, il caffò, la conversazione con donne, e maggiormente il colto.

Se la blennorragia avesse alto grado d'infiammiazione, se grande risulti la difficoltà di urinare, e l'erczioni del membro cagionino dolori insopportabili, a voi si raccomanda: astinenza pressocchò assoluta de'cibi, l'assoluto riposo, i bagni tiepidi generali spesso ripeluti, i lavativi, i cataplasmi emollienti posti al perinco (1).

Talvolta essendo i dolori insopportabili, fatevi salassare dal braccio che ne sarete al momento sollevati: coal vi farete delle infesioni coil 3 grancili d'estratito acquoso di oppio in sei once di stequa; prenderete questo rimedio anche per bocca un grancilo la mattina ed uno la sera: potete far uso anche della caniera prendendone due granelli trè volte al giorno.

Cessata l'infiammazione, e ve ne acorgerete dal non sentir più dolore, nè cociore nell'urinare, prendete per bocca, 4, o 5 granelli di mercurio dolce ogni mattinaz questo rimedio vi preservetà dall'infezione del songue.

⁽¹⁾ Perinco è lo spazio frapposto tra la borsa , e l' ano.

Parete uso nel medesimo tempo delle inicaioni toniche ed astringenti, col disciogliere in una libra di acqua o mezza dramma di solfato di zinco, o due dramme di solfato di allumina, o uno scropolo di solfato di rame, o mezz'oncia di acetato di piombo, o due dramme di estratto di ratania, o 3 granelli di sublimato corrosivo, o 4 granelli di intrato d'argento, coll'aggiungervi mezza dramma di laudano liquido, oppure 10 granelli d'estratto d'oppio. Invece di tali soluzioni potete servirvi dell'acqua di colonia. Se ciò non ostante lo scolo persistese, applicatevi un vessicante o al perinco, o alle cosce (1).

Chi tra voi non volesse assoggettarsi a tali rimedi, può far uso del metodo di Londra. Questo preserive: neci primi sei giorni, latte per continuata bevanda; negli altri sei acqua calda pura ed unita al latte con un granello di oppio per ogni sera; in fine acqua ealda semplice (2).

Potete servirvi pure ed utilmente del metodo di Welpeau eol farvi de l'avativi con 2 sino a 4 dramme di balsamo copaire sciolto col tuorlo d'uovo, o nella decozione di altea, unendovi 4, o 5 granelli di canfora essendovi erezioni.

Ma eccovi il più sicuro rimedio: attenetevi a questo e poco fate conto degli altri: (3) nel primo stadio

Valgano pure le sciutille elettriche lungo l'uretra.
 Altri luglesi usano l'injezioni d'ossido bianco di zinco sciolto nell'acido acetoso, mescolando 20 gocce di questo con 4 once di acqua.

⁽³⁾ È il metodo rinnito del Barone Wedekind, e di Granfe di Berlino.

ossia nell'inflammatorio quando cioè vi sentite de' dolori nell'urinare, e del bruciore, fatevi la seguente ricetta: solfato di zinco scropolo uno, acqua distillata once dieci , estratto di saturno gocce venti. Di quest' acqua fatevi delle siringhe lungo l'uretra, avvertendo di non farla penetrare più di tre o quattro dita facendola rimanere per due minuti circa, e ripetendola 5, o 6, volte al giorno. Nel medesimo tempo prenderete per bocca ogni due ore un cucchiaîo di questa emulsione prescrivendovela così: nitro puro dramma una, emulsione di mandolre dolci once otto, sciroppo di viole ence due. Quando poi saià cessato il bruciore vi farete delle siringhe con questa second' acqua: acqua di rose libra mezza, solfato di zinco granelli dieci , laudano liquido dramma mezza. Perbocca poi prenderete ogni tre ore un' cucchiaîo di quest' altra emulsione : emulsione di mandorle dolci once otto, tintura d'oppio semplice scropolo uno, sciroppo oppiato oncia una. Se quest'ultima pozione non vi guarisse in pochl giorni, prendete due pillole la mattina, due a mezzo giorno, e due la sera delle seguenti: balsamo di copaise dramme due, calomelano granelli cinque, polvere di cubeba torrefatta quanto basta a far pillole di granelli due l' una.

Unitamente all'asso di questi rimedi convien che badiate, alla scelta dei cibi e delle herande. Luogi quindi da voi le fritture, l'entrate, le sostanze oleose, e tutt'altro condito con grasso, come i salumi, i salati: evitate pure i liquori spiritosi , il caffe, il vino, e tutto ciò che può produrre indigestione, ed aumentare l'irritazione del membro. Obbedite ancora a queste altre

prescrizioni : evitate le congestioni delle fecce nell'intestino col tenervi il ventre bastantemente libero : all'uopo vi farete de' lavativi di acqua semplice col mele ; oppure mangerete delle pere , mele ben cotte , o delle prugne, fragole ec. Evitate le dolorose erezioni del membro col dormire in una stanza piuttosto fresca, sopra un duro materasso e state coverti leggermente. Usate la massima nettezza nel membro con lavarlo più volte al giorno con latte tiepido, o col decotto di malva o coll'acqua di calce di fresco preparata; ciò facendo, avvertite bene che la vostra mano bagnata dell' umor contagioso, non vadi a toccare gli occhi, il naso, le orecchie. Applicatevi in ultimo il sospensorio. Questo consiste in una borsa di pannolino dentro la quale si ricevono i testicoli e si tengono sollevati più ch'è possibile mediante l'afuto di alcuni legacci che cuciti alla borsa medesima si ligano attorno la parte inferiore della pancia.

Statevi a questi consigli, e vi guarirete sicuramente da una malattia se non pericolosa, almeno di grande incomodo.

Della scolazione delle Donne

La scolazione o blemorragia delle donne viene annumiata dallo scolo mucoso; opaco, o marcisso, aòsociato da un diverso grado d'infiammesione; ed eselusivamente sommistrato; nella maggior parte dei casi, dalla membrana che tapezza la vagina e'l suo orificio, talvolta anche dall'interno dell'uretra.

Indipendentemente dal contagio venereo, dall' abuso

ucl coito, e da altre cause già di sopra enunciate, può venire la blennorragia dall' orgasmo precedente la prima mestruazione nelle giovanette, dai tentatri pratienti per lo stupro, dai primi amplessi confugali, dalle frequenti titillazioni, dall' abuso de' lavativi irritanti, dalla soppressione o cessazione de' mestrui, dalla gravidanza ec. Quì si parla soltanto della prima.

La materia che forma lo scolo è affatto simile a quella dell'uomo; la sua acredine riesce talvolta così forte da escoriare le parti esterne della generazione.

Questa malatia essendo recente, è associata da un incomodo prurito, e da certa sensazione penosa di tensione e di calore alle parti, incomodi che crescono sensibilmente nell' urinare, e le malate a gran fatica camminano e stan sedute, locchè dipende dal gonfiamento delle parti le quali sono scinpre più o meno infiammale.

Del resto è difficile distInguere la blennorragia venerca nelle donne: a non ingannarsi convien ranumentarsi dele riflessioni del Palletta. Questi di per segno della blennorragia venerca delle donne, il sentirsi tanti granelli per la vagina, la complicata scolazione della clitoride (1), un qualehe ingrossamento nelle piegature inguinali, lo scolo marcioso invece di esser mucoso e filante, e le macchie più sporche sui panni. Se a questi segni si uniscano le esserescenze o le esulcerazioni nelle vicinanze dell'ano, non vi sarà alcun dubbio sulla natura del male.

⁽¹⁾ Piccolo organo erettile della donna situato fra le labbra della vulva sotto l'angolo superiore.

Si guarisce tale scolazione con l'uso delle hevande dilueuti e nitrate, come di sopra son prescritte; coi bagni ripetuti, col riposo, e con i cibi poco nutriente riscaldanti; a ciò si aggiungono le ripetute lavande, l'uso pure delle siringhe fatte col latte tiepido, col decotto di malva, o di altea, o di teste di papaveri, o di solano, o di acqua di calce, oppure con la seguente: acqua dissillata tibra una, acetato di piombo liquido dramma una, estratto acquoso d'oppio granelli dieci. Calmata l'infiammazione si faranno delle unzioni con la pomata mercuriale nell'interno delle cosce mattina e sera, con tauto di mercurio per quanto ne può prendere l'estremità di un dito. Si faranno egualmente in quell'epoca le infezioni astringenti come si son prescritte nella blennorragia dell'uomo (1).

Se nel corso della blennorragia, per la grande infiamniazione, nascessero nelle grandi labbra dei tumori dolorosi e caldi, covriteli con empiastri emollienti, che presto venuti a suppurazione guariranno da loro stessi.

Attenetevi, siguore, a questi rimedî; allontanatevi aschiatamente dagli uomini, se bramate una perfetta guarigione; altrimenti il ritorno de' metrui ad epoche assai prossime, vi rinnoverà gli scoli nell'istante che sembravano affatto vinti, e vi farà incorrere a funesti accidenti.

La blennorragia delle donne è molto meno soggetta a supprimersi accidentalmente di quella degli uomini;

⁽¹⁾ Il rimedio di Girtanner che guariva dentro 5, o 6 giorni, consiste nell'uso delle injezioni fatte con acqua di calce, e soluzione di pietra caustica.

Tale infiammazione uterina non produce scolo veruno, almeno d'ordinario. Si disipa col salasso praticato dal braccio; per mezzo delle miguatte applicate
nelle grandi labbra, e nel pube; coi bagni tiepidi più
di frequente ripetuti; colle losioni pure, colle fumigazioni, e coll'uso delle siringhe praticate colla decozione di malva, lattuga, solano ec. Sulla pancia si
farauno egualmente delle fomentazioni emollienti, siccome deve farsi sulle parti genitali esterne. Il riposo
sarà assoluto, e la dieta severa. Così richiamato lo
seolo, il tutto rientra nell'ordine, nè hassi più da
medicare se non che una blennorragia ordinaria.

CAPO SECONDO

in great or or part

Malattie prodotte dalla Scolazione

Nel corso della blennorragia possono accadere varie malattie, tra le quali le principali sono, l'ingorgo dei testicoli, il fimosi, il parafimosi, l'iscuria venersa ed altre.

SEZIONE PRIMA

Ingorgo de' Testicoli

L'ingorgo de testicoli, detto testicolo venereo, o gonorrea caduta nelle borse, consiste nel goniore inflammatorio di uno, o di ambedue i testicoli, associato alla diminuzione o soppressione totale della scolazione.

Questa malattia è cagionata da tuttocciò che è capace di far cessare la blennorragia innanzi che abbia
percorse le sue diverse fasi, e sia capace di produrre
forti irritazioni sui testicoli: quindi l'uso innanzi
tenpo delle siringlie, e pozioni astringenti, per la
smania di vedersi troppo presto guariti dalla scolazione;
i bagni freddi, Le esposizione alla temperatura fredda
ed umida, gli sforzi violenti, i colpi, la danza, la
scherma, le lunghe camminate senza sospensorio, i purganti violenti ce.

Principia tale malattia con certa sensibilità oscura e lieve gonfiamento nell' estremità superiore del testicolo che ben presto va ad occupare tutto il testicolo, il di cui corpo attaccato da infiammazione 'atmeuta di volume per 4, 5, 8 volte dispiù del naturale : in quent'ultimo caso il dolore è insopportabile, facendosi risentire siuo ai Jombi, comunicandosi talvolta l'infiammazione sino all'esterno, per cui si vede la borsa arrossia, e si sente tesa e dolente.

Le prime cose che farete per guarirvi da tal male sono: riposo assoluto, positura orizzontale, semicupi e fomentazioni, bagni generali, cataplasmi emollienti, come di malva, lattuga ec. inaffiati se il dolore sia intenso, con 30, o 40 gocce di laudano liquido. Prenderete per locca il siero del latte, o la decozione di gramigna, o quella di orzo con 5, o 6 granelli di nitro per volta.

Se poi l'intensità dell'infiammazione vi cagionasse la febbre, fatevi salassare dal braccio; ma il più delle volte basta l'applicare 12 mignatte sulla borsa. Quando il tumore si è reso indolente e molle, fate uso degli astringenti e risolventi : applicatevi sul testicolo delle pezze bagnate nell' acqua di Goulard, o i cataplasmi di farina di riso, o di segala spolverizzati con poco di muriato d' ammoniaca, ed inaffiati coll' acetato di piomho : dirigetevi sulla parte i vapori dell'accto, e fatevi pure leggiere fregagioni di mercurio,

Farete sempre cosa ottima richiamando lo scolo nell'uretra, specialmente quando l'irritazione, e l'ingorgo persistano . mediante l'introduzione che farete nell'asta di una candeletta di gomma elastica o asciutta, o bagnata di materia blennorragica : lo potete richiamare coi bagni caldi, o cataplasmi ben caldi sulla verga.

Quando vi rimanosse qualche durezza sul testicolo, avvaletevi pure delle unzioni fatte con l'unguento napolitano, degli empiastri di gomm' ammoniaca, di quello di Vigo con mercurio, di cicuta, o del linimento volatile.

Qualunque cura che sceglierete unitela all'uso del sospensorio, e prendetevi per locca qualche preparazione mercuriale (1),

⁽¹⁾ Swe-liaur loda in questa malattia la radice di mandragora, Akrel la radice di ononide. Fothergill l'oppio

SEZIONE SECONDA

Del Fimosi

Dicesi fimosi (1) quello stato della verga in cui il prepuzio rinserrato nel suo orificio pon può essere ricondotto posteriormente alla corona del glande.

Si distingue il fimosi congenito, e l'accidentale. Il primo è frequentissimo tanto vero che presso gl'israeliti Mosè impose qual precetto religioso, la pratica della circoncisione. Il secondo può nascere in segnito di molte cagioni; così lo possono indurre la lungherza e strettezza naturale del prepuzio; il riscaldamento delle parti per mezzo del ballo, del cavaleare, del coito; la negligenza nel nettarsi sì il prepuzio che il glande nella blennorragia, le ulcere venerce ce.

Può anche il fimosi formarsi spontaneamente nei vecchi assai nudriti, allorquando sono interamente in loro cessate le facoltà virili; la qual cosa osservasi piuttosto in questi individui, che nei magri; cessando in tal caso il glande ed i corpi cavernosi di svilupparsi mediante le erezioni, perdono la nutrizione, il prepuzio si allunga di molto, dal che ne nasce il fimosi. È cosa facile il riconosecre il fimosi: esso impedisco

Van-Swieten gli occhi di gamberi, e'l vino del Reno.

Aepli assicura che un contadino si guari di tal male con l'uso delle lucertole rosso-verdi.

È stata usata l'elettricità , l'unguento canforato, l'estratto d'aconito ec.

Questo vocabelo fimosi Capistratio è derivato dal greco fimoo, che significa incapestrare, porre la musuliera, striugere con corda.

sempre lo svaginamento del membro; il prepuzio ora vederi arrossito ed infiammato, ora è pallido, lucido, e trasparente. Alcune volte è talumente ristretto che giunge ad impedire anche il corso all' urina.

Da ciò si distinguono due specie di fimosi: gli uni sono inflammatorì, gli altri indolenti. Nel fimosi inflammatorio il prepuzio si gonfia, diventa di color rosso variamente carico, e dolorosissimo. L'indolente poi è sempre privo di sensibile mutamento nel colore della pelle. Talvolta il prepuzio è duro e resistente, altre volte è molle compressibile e sembra formato da inzuppamento sieroso nel sco tessuto.

Per guarirvi dalla prima specie di fimosi convien che procuriate di togliere il gonfiore inflammatorio del prepuzio, o la forte tensione per la quale vedesi rinserrato.

Vi gioveranno all' uopo le applicazioni degli empiastri emollienti, i bagni, le bevande diluenti, la minorazione de' cibi ce. Se gli accidenti fussero più intensi, fatevi salassare dal braccio, o per lo meno applicatevi non poebe mignatte al perineo. Usate poi sempre attenzione di rialazare il membro contro del ventre, onde favorirne il ritorno del sangue e scemare l'infiammazione. Farete ammeno di scovrire le ulcere qualora siavene delle nascoste, e vi limiterete a praticare frequenti infezioni col latte tiepido tra il prepuzio ed il glande, e le unzioni di pomata mercuriale.

I fimosi indolenti vengono spesso abbandonati a so atessi, e spesso si dissipano così sebbene sempre con lentezza. Se rimangono però troppo alla lunga, favoritene la guarigione coi bagnuoli dell'acqua di Gaulard, dell'ossicrato, dell'acqua di calce co.

SEZIONE TERZA

Parafimosi

Lo stringimento del prepuzio dietro il glande, costituisce il parafimosi (1). Questo accidente nasce spesso dal poc'anzi esposto, dal fimosi, quando cioè l'inferme tira con forza il prepuzio indietro; allora gonfiato dippiù per l'irritazione crescente, non può più tornare innauzi. Altre volte le medesime cause capeci ad indurre il fimosi, inducono pure la malattia di cui parliamo.

Il pericolo nel parafimosi è ancor più grande che nel fimosi , venendo per esso la ghianda dietro la corona strangolata per modo , che s' impediace tanto l'uscita della materia blennorroica e dell'urina, che il regresso del sangue: indi più presto l'infiammazione si sviluppa, alla quale può anche la cangrena sopraggiungere. In altre circostanze la irritazione è minore , ed il gonfiamento del prepuzio è pallido, molle, e sieroso: si forma in tal caso il parafimosi indolente, non mai pericoloso,

Siate solleciti a curarvi in questa malattia quando è inflammatoria: ricorrete subito a quei rimedî, che vi ho raccomandato per la guarigione del fimosi; ma so

Vocabolo derivato dalle due greche parole para al di là ;
 da fimoo io stringo con una corda.

questi non vi giovassero positivamente, fatevi da per voi questa operazione, dettatavi da Cullèrier lo Zio: premeteri in primo luogo fra le dita il glande ed il prepuzio in guisa da far risalire buona parte dei succhi sparsi in questi siti, al di la dello strangolamento; dopo di che essendo le parti rammollite e meno tese ungetele con l'olio di mandorle dolci, e nel mentre che con una mano cercherete di ricondurre il prepuzio anteriormente, coll'altra comprimerete in direzione opposta l'intero glande. Pervenuti a ridurvi il parafimosi, riattateri le parti con bagni, fomenti, lavande ce. per quindi dissipare ogni irritazione superstite. Se vi saranno ulcere o scoli, li guarirete nel modo che vi dirò, o vi ho già detto.

Se dietro l'uso di tutti questi rimedi, che non cesso caldamente di raccomandarvi, il parafimosi si mostrasse ostinato, non mancate di consultare un chirurgo, mentre il male non può essere altrimenti distrutto se non per opera di questo,

SEZIONE QUARTA

Iscuria Venerea

La ritenzione dell' urina , ossia l'impossibilità di uriare per l'esistenza della blennorragia, chiamasi iscuria veneraa (1). Questa nasce ogni qual volta l'infiammasione dell' uretra abbia preso un'aumento considere-

⁽¹⁾ La voce iscuria deriva dalle due greche parole isco io ferme, e oiron urina.

volc o per colpa del curante o dell'infermo, inducendo uno spasmo nel collo della vessica urinaria. In questo caso lo scolo si arresta repentinamente, dolori violentissimi assalgono l'infermo, e suocede un totale trattenimento d'urina.

Se per disgrazia incorreste in questa malattia ponetevi subito, e replicate volte ne' bagni tiepidi, fatevi delle fomentazioni sulla parte, de' lavativi ; applicatevi molte sanguisughe o nel perineo, o sopra del pube (1), oppure nell'interno delle cosce. Sul membro ponetevi un'empiastro tiepido fatto di malve o lattughe; e se questo non vi giovasse, ponete il membro spesso spesso dentro dell'aoqua fredda. Se il male si avanzasse, fatevi salassare dal braccio; tentate pure l'applicazione della cipolta cotta nel perinco, e cercute al più presto l'aiuto del chirurgo. Questi seguirà forse il consiglio di Girtanner, che ne casi disperati fa porre le gambe ' sino alla pelpa nell'acqua gelata. Userà il metodo di Hamilton, cioè gran dosi di muriato di mercurio con oppio ogni sei ore; e ricorrendo alla operazione del cateterismo, vi salverà da un male penosissimo e pieno di pericoli.

Altri moltissimi inconvenienti possono venire in seguito della mal diretta cura della blennorragia, ma taccio qui dal descriverveli,, poiche la cura loro si appartiene al più esperto professore sanitario: vi assicuro

⁽¹⁾ Pube è quel sito elevato ricoverto di peli ch'esiste sotto della pancia.

però che son moltissimi (1), dai quali se liberar vi volete, attenetevi alle prescrizioni di sopra indicate per distruggere la blennorragia, ed evitate espressamente ogni cura che vi promettese più sollecita guarigione.

CAPO TERZO

Della Blennorrea

La blennorra generalmente definita, non è altro che lo scolo di un liquido alquanto viscoso, di eolore varismente bianco o giallastro, marcioso, proveniente da cavità vestite da membrana inucosa, e che non va accompagnata da veruna infiammazione. E oggidì applicato un tal vocabolo al solo scolamento passiro ed indolente dell' uretra mascolina, attesochè la blennorrea femminile va disegnata col nome di leucorrea.

La blennorrea detta pure stillicidio abituale consiste per solito nell' ultimo periodo della blennorragia, ep per dir meglio, è formata dalla blennorragia meno i segni dell' infiammazione. È dessa talvolta prodotta dal contagio venerco, e da qualunque agente stimolante sul membro : quindi al pari della blennorragia può esser-

⁽i) Tali sono la gonfierza o ingorgo della glandula prostata; i tumori di saziabile volume che formani nelle glandule di Cowper, o nel tessuto adiposo che ricopre il belibo dell' uretra: il deposito del materiale blennorragio nelle articulazioni, donde ne nascono bitopisis, funghi articolari ce. le vasie esplosioni catance, giusta le esservazioni di Cloqueti. Todalmia venesioni catance, giusta le esservazioni di Cloqueti. Todalmia venesioni catance, giusta le esservazioni di Cloqueti. Todalmia venesioni catante il proposito delle companio delle narici cei l'epilessia, il caniplegia, le sellete essimate, ile aliensioni metalti se.

prodotta dalla manustuprazione, dall'abuso de'liquori fermentati specialmente della birra, dal coito ripetuto con donna sana, o mestruante, o che abbia lo stesso male, dall'uso delle candelette, dalle iniezioni irritanti, da qualche ulcera situata profondamente nell'uretra, dall'sficione podagrosa, retumatica ec.

L'umore emanato dalla blennorrea è di variabile spessezza, più o meno abbondante, e lascia per solito sul pannolino delle macchie di color giallo-chiaro, tal-volta rossastro se dipende dall'esulcerazione. Non è mai detto scolo associato da bruciore; solo vi è talvolta qualohe solletico nell'urinare.

Si disinguono 7 specie di blennorree 1 quelle prorenienti da debolezza, che seguono ordinariamente alla blennorragia. 2 quelle cagionate e mantenute da ecciamenti locali ripetuti di frequente, come quelle che vengono in seguito della manustuprazione, coito ripetuto ce. 3. le provenienti del stringimenti urettali (1). 4. le altre causate dall'ingorgo della glandula prostata. 5. le ulcerose quelle che derivano cioè da un'ulcera situata dentro il canale del-l'uretra. 6. le sifilitiche quelle che derivano dal contagio venereo (le sole contagiose). 7. le costituzionali quelle cioè che son prodotte dalla disposizione morbosa generale dell'economia, come dalla sifilide, dalle serofole, dall' erpete, dalla rogna, dalla podagra ce.

Per guarirvi dalla blennorrea sappiate distinguere in primo luogo la sua specie: questo non vi sarà tanto difficile portando la vostra attenzione al come vi so-

⁽¹⁾ In appresso si parlerà di tali stringimenti.

praggiunse lo scolo. Essendo difficile tale analisi, vi avvalerete delle prescrizioni di Swediaur più sotto riportate. La prima specie di blennorrea va guarita coll'uso degli astringenti che si son prescritti nell' art. blennorragia. La seconda che ordinariamente dura 10, o 15 giorni , cede alle bibite diluenti e nitrate: quindi servitevi di quelle prescritte nel primo stadio della blennorragia; in seguito farete uso degli astringenti. Le blennorree prodotte dall' uso della birra, cessano al non prendere più questa pozione (1). Le blennorree venute in seguito del coito (2), della manustuprazione, delle infezioni astringenti si dissipano allontanando la causa che le ha prodotte : del resto i bagni freddi, le inîezioni astringenti sono utili. Le blennorree della 3. 4. e 5. specie cedono all' uso delle candelette (3). Le blennorree costituzionali van curate sempre dai medici : ciò non ostante vi dico: che l'erpetica va guarita coi bagni o semplici o solforosi, collo zolfo preso internamente, coi vessicanti d'applicarsi in que siti ove esisteva l'eruzione: anche applicati sull' osso sacro, all' interno di una cosoia, fan giovamento. Così si guarisce pure la blennorrea derivata dalla rogna, la quale essendo ostinata si faranno forti irritazioni alla pelle con lozioni di sublimato, di sulfuro di potassa ec. La scrofolosa si vince col cibo rinforzante , con l'aria campestre , coi bagni marini , e con altri mezzi. La podagrosa cede all'uso delle be-

⁽¹⁾ La potenza che ha la birra di produrre la blennorrea, si neutralizza soprabbevendovi del rum, o acquavite.

⁽²⁾ Queste son frequentissime e son quelle che da voi diconsi sforsature.

⁽³⁾ Si parlerà in seguito di queste candelette.

rande diluenti e nitrate, ed al richiamo della podagra per mezzo de senapismi e de vessicanti, nei piedi. Verso il termine usate pure due o tre cucchia al giorno di balsamo tolutano, di quello del Perù ec. La reumatica (frequentissima) la guarirete coi bagni tiepidi, coi vessicanti, coi rimedi che aprono il sudore. Finalmente la blennorrea prodotta dalla massa del sangue infetta dell'umor sifilitico, assoggettatela all'uso del mercurio, che la vedrete guarita ben presto.

Se impossibile vi riuscisse il distinguere le diverse specie della blennorrea, attenetevi sempre alle prescrizioni dello Swediaur . che non ammette tante distinzioni. Con queste vi guarirete sicuramente, attesochè le blennorree più frequenti tra voi sono, o quelle che seguitano alla blennorragia, o quelle derivate dalle sforzature. Prescrivelevi perciò : balsamo del Coppaive once due, acido nitrico dramma una, o invece dell'acido, spirito di vino oncia una, e prendetene due cucchiat al giorno in più volte. Potete servirvi pure dell'infuso di china nel vino rosso, mischiato con po d'acqua, preso pure in varie riprese nella giornata. Fatevi contemporaneamente tre, o quattro volte al giorno una siringa con la seguente acqua : acqua distillata lib. una, acqua canforata once tre, solfato di zinco dramma mezza. Oppure acqua comune lib. una, acetato di piombo dramma mezza, allume scropolo uno. Non giovandovi questi rimedi, prendete l' olio di trementina mezzo cuechiaîo in ogni mattina; fatevi i peneluvî (1) con l'acqua fredda avvivati con

⁽¹⁾ Peniluvio è l'immersione della verga nell'acqua.

l'aceto, od acquavite: al perinco fate spesso l'unzioni con la pomata mercuriale.

CAPO QUARTO

Incomodi residui dopo la blennorrea

Gl'incomodi che spesso vengon dietro alla blennorrea posson esser vari: qui vi descriverò soltanto la cronica incordatura del membro, e gli stringimenti uretrali (1)-

SEZIONE PRIMA

Cronica incordatura del membro

Dopo guarita totalmente la blennorrea rimane talvolfa una incurvatura della verga che impedisce di bene effettuare il coito, doloroso lo rende, e spesso senza effetto (3). Quando il membro è in erezione, tale incomodo cade sott occhio : esso è sempre incurvato. in basso, dalla quale disposizione ne deriva l'impedimento al coito.

Lodano i medici per guarre un tale incomodo, le pillole di cicuta, e la tinctura. autimonii Iacobi, ma voi servitevi de rimedi esterni: prendete del cerotto di cicuta, spalmatelo su di un perzo di tela, ed applica-

⁽¹⁾ Più spesso questi incomodi si verificano in seguito della blennorragia.

⁽²⁾ È conseguenza di violenta inflammazione, la quale fa perdere al canale dell'uretra la facoltà di allangars i nella stessa proporzione dei corpi cavernesi.

telo sul membro; o avvaletevi del consiglio di Swediaur; prendete un' oncia o due di linimento mercuriale, e e spesso spesso fatevi delle unzioni nel membro: oppure fatevi preparare delle acque alcaline sulfurce, e con queste fatevi delle docciature, facendo cioè gocciolare dette acque dall'altezza di 5 in 6 piedi, sul membro medesimo (1). Sjate perseveranti su queste cure perchè il male è ostinato.

SEZIONE SECONDA

Stringimenti uretrali

Anzi che della blennorrea, è piti spesso che si crede conseguenza ordinaria della blennorragia, l'incomodor che vi descrivo. Desso forma una delle cause più frequenti della ritenzione dell'urina. Ha luogo per lo più in un solo punto del canale dell'uretra, qualche volta in due, ed anno in tre diversi siti.

Le cause più comuni del ristringimento dell'uretra sono: l'ingrossamento delle sue pareti, il loro indurimento, e la costrizione del canale come fusse serrato da una corda,

Dopo uno, tre od arche sei anni dacchè apparentemente si mostrò gharita una blennoiragia, principia l'individuo ad accorgessi che l'urina invece di uscire a pieno canale, esse in un piccol filo: ciò obbliga a degli aforzi, e per lo.più l'urina esse in due getti separati. Quando lo stringimento è considerevole, i più

⁽¹⁾ Si raccomanda pure l'elettricità.

grandi sforti non sono bastevoli a far sortire l'urina a zampillo; cade al contrario a goccia a goccia e lentamente. Allora si veggono alcuni malati trovar sollievo nel tuffare il membro dentro dell'acqua fredda, poichè vi urinano, ma a grandi sforti. Altri sono obbligati a comprimere e stirare il membro. L'urina intanto ristagna nella vessica, si altera, s'intorbida, ed acquista un'odore particolare (1). La vessica si gonfia, si rende protuberante sopra la regione del pube, ove sentesi una tensione dolorosa ed una prominenza periforme: si sviluppano in questo caso tutti i fenomeni della iscuria venerea.

Se presto i rimedi dell' arte non si appongano ai progressi del male, il ristringimento dell'uretra dà spesso luogo ad una crepatura più o meno estesa delle pareti di questo canale, quella che accade tra lo stringimento ed il collo della vessica. L'urina sortendo per quest' apertura s' insinua nel grasso circovicino, fa un deposito che va a degenerare in fistola, se il male si abbandonerà a se stesso. Allora è il caso di ricorrere presto al consiglio del medico, mentre il male se non si farà serio, sarà penosissimo e lungo.

Il ristringimento dell' uretra è una malattia semplicissima, di facile e pronta guarigione se vi si da riparo nel principio: ma la malattia è molto più funesta ed espone il malato a gravi accidenti, se è trascurata. Siato dunque accorti, nè lasciate lusingarvi se dopo aver

⁽¹⁾ Così alterata l'urina spesso depone un sedimento mucoso, viscoso, e di un colore bianco grigio. Questi fenomeni possono illudere facendo credere un catarro della vessica.

Valgono in primo luogo per ben disporre le parti alla guarigione tutti quei rimedî che abbiam detto esser utili per la iscuria venerea : usate e con perseveranza i bogni o semicupî tiepidi ripetuti di frequente, le fomentazioni, i lavativi, ed i salassi pure, specialmente i locali : potete prendere qualche leggiero diuretico (1) come per esempio l'emulsione di mandorle dolci con lo sciroppo di viole e pochi granclli di nitro. Il sovrano è più sicuro rimedio sta nell'uso del catetere di gomma elastica, ed in quello delle candelette. Queste si sono fatte di piombo, di osso di balena, di cera, di corde di budella ec. In oggi si fanno di gomma elastica, siccome debbono essere i cateteri, È inutile che qui vi descriva il come debba introdursi il catetere nella vessica, o il come debba procedersi per l'introduzione della candeletta. Queste operazioni siccome richieggono grand'espertezza non solo per la manualità, quanto per quello che spetta alla struttura e direzione delle parti sulle quali deve operarsi, così non è possibile elie da per voi vi possiate riuseire; basta solo però che il chirargo vi dia semplici norme per l'introduzione di quegli istrumenti, onde vedervi istruiti su tali operazioni. A siffatte condizioni, vi ho qui descritto gli stringimenti uretrali, anche perchè voi ne possiate

⁽¹⁾ Diuretico dicesi quel rimedio che ha virtù di promovene lo scolo dell' urina.

intraprendere nel principio la cura, e domandare a tempo il consiglio del professore (1).

CAPO QUINTO

Delle Ulcere Veneree

Se il veleno venereo rimane per qualche tempo a contatto col membro virile, o coll'interno della vagina, senza esserne assorbito sollecitamente, nascono quasi sempre delle ulecre in queste medesime parti.

Tali ulcere si dicono venerce in grazia della cagione che le produce, le quali possono pure svilupparsi in qualunque altro sito del corpo, quante volte in esso si depositasse una porzione del releno venerce mescolato nel sangue per altre malattie sifilitiche già sofferte.

Questa considerazione pone la necessità di distinguere le ulcere in primitive e consecutive.

Le ulcere veneree primitive nascono aempre in quel luego che viene immediatamente toccato dal veleno, e dove la tessitura sottile e delicata dalla pelle può favorire l'azione e l'assorbimento del veleno sifilitico quindi si osservano le ulcere primitive nel glande, nel prepusio, nella faccia interna delle grandi labbra, nelle piccole labbra, nell'ingresso della vagina, nel capezzolo delle sinne, nell'airo, nella bocca, nella lingua, nel velo palatino, nell'ingresso delle fosse nassil, per

⁽¹⁾ Vedi Boyer sull'art. della ritenzione d'urina prodotta dal ristringimento dell'uretra, trattato sulle malattie cerusiche.

essere questi punti dotati di una tessitura delicata e sensibile, favorevole all'azione immediata dalla potenza venerea, colla quale sono spessissimo a contatto.

Le ulcere veneree consecutive sopraggiungono più o men presto alla lue sifilitiea, e nascono per lo più su quelle parti ove la pelle è poeo distante dalle ossa, come al cranio, avanti le clavicole, allo sterno, alla faccia interna della tibia ec. Nascono pure nell' angolo delle labbra, tra le dita de'piedi, nell'ano, nel palato ec.

Le ulere primitive compariscono ordinariamente nei primi giorni dopo l'infezione, quattro o sei giorni dopo. Taluni asseriscono averle vedute compariue 15 giorni dopo un coito impuro, ed anche dopo quest' epoca. Intanto eccori i segni dai quali si può venire in cognisione della natura delle ulere di cui si parla.

Suole la parte infetta farsi rossa peco tempo dopo l'infezione, indi vi si solleva una vessichetta che s'infianma, si rompe, e si cangia così in una piecola ulcera del tutto superficiale.

Il suo fondo dilatasi a poco a poco, si fa duro, e comparisce hianco-giallastro e come lardaceo. Gli orli si fanno rilerati e duri ancora; qualche volta d' un rosso chiaro, e spesso giallognoli come il fondo. La pelle che circonda l'ulcera si fa rossa, dolente ed infiammata: tante volte pure questa infiammazione non esiste. La materia che tramanda ha un colorito verde giallognolo, e spesso tanto acre e caustico che corrode le parti che tocca.

Per lo più dopo che l'ulcera ha presa una certa estensione, le glandule situate nella piegatura delle cosce divengono dolorose, s' ingrossano, s' infiammano e spesso suppurano formando una seconda malattia venerea.

Le ulcere che si stabiliscono sul glande non hanno gli orli tanto duri e rialzati , e sono un po scavati nella sua sostanza. Quelle che hanno la loro sede sul prepuzio sono più grandi, e presentano gli orli più duri e dolenti. Del resto maggior dolore apportano se son situate nel corpo della verga, nella borsa, nel perineo. Bramate maggiori dilucidazioni onde facilmente riconoscere le ulcere veneree? Siate attenti a questi caratteri. Le ulcere veneree nascono in siti particolari, in quelli cioè che sono di sopra menzionati : più spesso nelle parti sessuali : hanno sempre un fondo lardaceo o grigio, e gli orli duri, arrossiti senza essere rovesciati e gonfi. Perloppiù si dilatano più in larghezza, che in profondità, e toccandosi danno molto delore. L'umore che ne sorte è giallo-verdastro, e capace di scottare le parti che tocca. In ultimo se queste esulcerazioni nascono dopo pochi giorni, dacchè si ebbe commercio con donna sospetta, non vi sarà più dubbio sulla loro natura specialmente se vi fusse già una blennorragia.

Le ulcere venerce sotto una mal diretta cura tendono sempre, specialmente ne'vecchi, a convertirsi in cancri, o passare in cangrena: se esistessero nel perinco delle donne potrebbero corroderlo per intero. Non vi lusingate perciò di potre guarire da tal malattia senza l'atuto de'rimedi: la sola e semplice forsa della mutura non basta a distruggere tale infermità. Ben presto dunque datevi la pena di curarvi se incorrer non volete amille soonerit.

Prima di dar principio alla cura delle ulcere veneree . badate bene se desse sieno associate da rossore , gonfiore e dolore ne contorni, oppur no; nel primo caso essendo infiammate, contentatevi di covrir l'ulcera con un corpo grasso rilassante ; di bagnare spesso la parte con un liquore ammolliente come di decotto di altea, di malva, di lattuga, di semi di lino ec, ricovrendola ancora cogli empiastri di queste foglie, contemporaneamente astenetevi del tutto dal moto; statevene a letto più che potete; evitate i cibi sostanziosi, il vino, il rum ec., così l'infiammazione andrà a ocdere dentro pochi giorni. Quando sarà distrutta l'infiammazione o questa non esisteva affatto, potete servirvi per distruggere il male, di diversi rimedi: potete quindi avvalervi delle bagnature spesso spesso ripetute, con l'acqua fagedenica, lasciando in faccia dell'ulcera delle piccole pezzoline bagnate colla stess'acqua: potete ricovrire l'ulcera ogni mattina con picciola quantità di polvere di occhi di granchi, e mercurio dolce : all'oggetto fatevi dare venti granelli dell'uno, e dell'altro rimedio, e fatene cadere sull'ulcera tanto per quanto basta a ricovrirla leggermente; ponetevi quindi morbide filaccia. È anche a vostra volontà di ricovrir l'ulcera con l'unguento napolitano spalmato sopra una sottile perzolina, o filaccia, lavandola in ogni medicatura col decotto di orzo: oppure di spargervi sopra pieciola quantità di ossido rosso di mercurio, o del sotto muriato di mercurio ; servendovi del primo rimedio piuttosto quando l'ulcera trovasi ricoverta da crosta dura; e del secondo quando il fondo fusse rosso e vermiglio, nella quale ultima circostanza i bagnuoli astringenti

fatti col solfato di rame, coll'acetato di piombo, colll' allume, che vi prescriverete cogli stessi nomi p. e. bagnuolo di acetato di piombo ec. sono i rimedi migliori di cui si possa far uso.

Se l'ulcera tardasse a chiuderai e si rendesse oltremodo dolorosa, prendete un granello o anche due al giorno di oppio puro per bocca, e prescrivendovi il bagnuolo di oppio, fatevi delle lavande sulla stessa.

Quando dietro l'uso di questi mezzi l'ulcera si remdesse stazionaria ed i suoi bordi si facessero duri, convien eccitarla con i caustici: quindi toccatela colla pietra infernale, o col muriato d'ontimonio. Giova contemporaneamente il buon vitto, il respiro d'aria campestre, l'allegrezza dello spirito ec.

In riguardo alla cura delle ulcere della vagina, e dell'utero, associate da seolo di materiale marcioso e sanguigno, è da prescriversi l'infezione con l'infuso di diramma una di corteccia di china in una libra di acqua di calca, coll'aggiunta di 5 o 6 granelli di mirra, o di assafetida,

Le semplici decorticazioni del glande, o del prepuzio, si guariscono coi bagnuoli dell'acqua vegeto-minerale. Qualunque cura che sceglierete delle menzionate, unitela ad una soverchia polizia della parte.

In ordine alla oura generale stabilita per le ulcere primitire, vi sono diverse opinioni. Chi non la vuole affatto attenendosi ai soli rimedi locali (1). Chi loda la cura generale fatta col mercurio, disprezzando i zimedi locali (2). Altri finalmente sono dell' uno e del-

⁽¹⁾ Girtanner , e Nubet.

⁽²⁾ Hauhemann.~

Ma egli è certo pure che il mercurio amministrato nella cura delle ulcere primitire, ha possanza di prevenire nella massima parte lo sviluppo della lue. Fate dunque uso del mercurio prendendolo più spesso per bocca nel modo che vi prescriverà nell'articolo della lue (1).

CAPO SESTO

Bubone venereo

Col nome bubone (2) che significa inguine, enfiato, ciccione, gavocciuolo, tincone, indicarono gli antichi i soli tumori che nascono nelle glandule situate nella

⁽¹⁾ Secendo le idee di Hunter il metodo più semplice di curare le ulcere veneree, si è quello di estirparle col caustico, a col coltello, con che le riduce allo stato d'ulcera comune, o di una ferita, curandole in seguito come tali.

Girtanner le medicava con solutione di pierra caustica allungata; ovvero con acqua di calce di fresco preparata, e toato che l'alcera si rendeva vermiglia e malle, la faceva chiudere con una solutione allungata di estratto di Saturno del Gaulard.

⁽²⁾ Denominazione derivata dal vocabolo greco bubon.

piegatura delle cosce: poco dopo coll'istesso nome, si ehiamarono pure gl'ingorghi glaudulari delle ascelle, del collo, e dei dintorni della mascella inferiore, qualunque ne fusse la causa. I medici moderni serbandogli la stessa accettazione, ne han distinto cinque diverso specie, cioè il bubone simpatico, quello d'irritazione, il pestilenziale, lo scrofoloso, il canocroso, ed il sifilitico ossia venereo. Vi parlerò quì del solo bubone venereo giusta lo scopo propostoci.

Il bubone venereo è un certo tumore formato dal'ingorgo delle glandule spettanti agl' inguini, o all'ascelle, o al collo irritate direttamente od in via simpatica dal veleno venereo. Però la sua sedo ordinaria è agl' inguini (1) locchè spiega il motivo per cui il volgo lo indicè sotto il nome di puledro, essendo il malato costretto, specialmente se il tumore risulti voluminoso, a camminare disgiungendo le gambe, come fanno i cavalli giovanissimi il cui andamento è per anco incerto.

Si distingue il bubone venereo in primitivo, in consecutivo, ed in costituzionale. Il primo si manifesta senae essere stato preceduto da niun'altra infezione, e comparisce dal terzo al sesto giorno dopo un coito sospetto: chiamasi pure bubone subitaneo o di prima giunta. Il secondo nasce sempre in seguito alle ulcere, pustule, o scoli primitivi. Esso non si dà a vedere prima degli otto o diect giorni dal momento in cui dichiarossi uno di quei mali. È nato pure dopo la cicatrizzazione di

⁽¹⁾ Inguine, anguinaglia, inguen, è le piegaturn che separa nel davanti la coscia dalla pancia.

Si dividono pure i buboni in inflammatori, ed indolenti (badate a tale distinzione): i primi sono dolorosi, rossi, e cammiano verso il proprio termine sollecitamente, sia che tendano alla risoluzione, o alla suppurazione. I secondi si sviluppano con lentezza, quasi senza dolore, non presentano verun mutamento di colore sulla pelle, suppurano di rado e se appre dificilmente.

Eccovi i carratteri che vi rappresentano i buboni venerei.

I buboni venerci si osservano in ambedue i sessi, ed incomodano indifferentemente o l' una, o l' altra anguinaglia. Sono dessi dei tumori d'ordinario obbonghi, e collocati obliquamente (1). La loro comparsa è preceduta da un sesso di molestia alquanto dolorosa nella regione inguinale, ciò che tante volte viene attributio a cammini sforzati, a fatica eccessiva; ma subito che vi si ponga sopra la mano si trorano una, o più glandole tumefatte e sensibili alla pressione. A qualunque epoca si muovono sotto della pelle, e non sono cambiati nel colorito naturale. Aumentandosì l'irritazione, si comunica alle parti vioine, e ne risulta certo tumore si comunica alle parti vioine, e ne risulta certo tumore

⁽¹⁾ Questi tumori essendo collocati sopra la piegatura della coscia nominausi buboni addominali; mentre diconsi crurali se sono collocati nella parte anteriore e superiore della coscia.

di variabile grandezza, duro, aderente, che molesta molto la progressione, la cui superficie diventa rossa, dolente, e che diviene la sede di dolori pulsanti, sempre più violenti: in ultimo si stabilisce un centro di suppurazione con maggiore o minor prestezza secondo: la violenza dell'infiammazione.

Qualora il bubone sia indokente, oscurissima dimostrasi la sensibilità di cui esso è fornito; vedesi allora composto di tanti piccioli tumoretti (1) che spesso persistono per molte settimane o mesi. Si sviluppa e decresse con pari lentezza attesa la sua inerzia, e lascia de' tumoretti indolenti che si dissipano con grandissima difficolti.

Possono i buhoni sifilitioi avere varie terminazioni : coòciditescenza, metastasi (2), indurimento, cunero, e cangrena. La risoluzione è il più frequente esito, e fortunatamente riesce altresì il più heneaugurato sicebè tutit gli sforzi vostri (come dei chirurgi) delshono mirare ad ottenerlo. Del resto la suppurazione non deve
ritenessi per così funesta com' è stato credute; meglio
però di evitarfa se possibilie.

Le differenze presentate dai buboni sifilitici, indica-

⁽¹⁾ Sono questi le differenti glandole che compongono il bubone le quali rimangono per gran tempo separate tra loro, perció che il tessulo cellulare che le ravvolge non partecipa della loro debole irritazione, e la pelle ritiene il suo colore orditurio.

⁽²⁾ La risoluzione è nno dei modi di terminare della inflammatione, jin cui la parte inflammata riturna poco a poco nel suo stato normale sensa divenir sede di supparazione. La delitescenza è la scumparas asbitanea dei fenomeni inflammationi cha metatsiari è il trasporto del male da un'orguno all'altro,

Se il bubone fusse dolente ed infiammato applicatevi subito molte mignatte 10. 12. attorno il tumore, e ripetetene pure l'applicazione, che il male si calmetà al momento: indi secondo il Lagneau ponetevi sopra del tumore del ghiaccio pesto almeno per 24 ore. Nel medesimo tempo usate il riposo, i bagni generali, le bevande rinfiescanti. Siffatti mezzi spesso riescono a dissipare l'infiammazione. Ma se mal grado il loro uso i dolori persistessero, aumentassero e vi si complicasse la febbre, col dolore pulsativo nell'interno del bubone il di cui colorito divenisse rosso-vivace : allora converranno l' assoluta dieta, le bevande diluenti, il siero di latte, le tisane di orzo, di gramigna, di gomma arabica ec, l' uso dei lavativi, delle fomentazioni e dei cataplasmi sul bubone, e se l'infiammazione vi si aumentasse, non risparmiate farvi salassare dal braccio abbondantemente. Se malgrado ciò non si risolve il tumore, vien presto e sicuramente la suppurazione appalesandosi dalla prominensa della sommità del tumore, e dalla fluttuazio-

⁽¹⁾ La difficultà nel dirigere la enra de baboni venerei, o nel vedere a qual estio sieno tendenti. Gli riffianmantori tente do più presto alla suppurazione; alla risolusione gl' indolenti. Quatare la risolusione degli altri che vanno evidentemente alla suppurazione?

ne (1); in tal caso se la raccolta della marcia si fece sollecitamente essa stessa si aprirà qualche uscita succedendone la guarigione senza rimanere d'ordinario la minima apparenza di cicatrice. In caso contrario, se ayrete coraggio, lo aprirete col ferro facendo un' apertura proporzionata al volume del tumore, e nella direzione della piegatura dell'inguine: meglio è però che domandiate nel rincontro il soccorso del chirurgo. Dopo tale apertura tante volte gli orli vengono rosicchiati dall' infiammazione , e ne risulta certa cicatrice molta deforme. In altre circostanze, quando la suppurazione si fece lentamente apriteli col caustico, specialmente se esistessero certi rimasugli indolenti nei dintorni del tumore. Applicando picciola quantità di pietra caustica nel centro del tumore posta prima sopra di un pannolino, vedrete ben presto aperto il bubone.

Aperto in qualsivoglia modo il bubone, l'ulcera che ne segue va medicata colle sfila asciutte, e se avvi ancora infiammazione ne contorni si continuera l'uso dei cataplasmi, cessata la quale, si medicherà colle sfile come si è detto. Se tardasse a chiudersi attesa la debolezza e la flaccidezza delle parti, di che vi accorgerete dal vedere pallidi gli orti della piaga, biancastro il fondo, e quasi indolente alle medicature, conversà che facciate uso dei digestivi; quindi laverete la parte con l'acqua fagedenica, con la soluzione di granelli 3 di sublimato in once cinque di acqua; o toccan-

⁽¹⁾ La fluttuazione, è il movimento comunicato al liquido contenuto nella cavità del bubone dalla forza di pressione delle dita.

40 dola col nitrato d'argento (pietra infernale) o col solfato di rame, oppure applicarvi delle sfila spalmate di unguento napolitano. Per bocca poi potete prendere 5 o 6 granelli di rabarbaro la mattina, o mezzo cucchialo di tintura d'assenzio, od un leggiero infuso di legno quassio.

Il bulsone venereo quando avià suppurato, vi espone sicuramente all'assorbimento del veleno, e quindi all'inferione del sangue. A prevenirei tristi effetti di tale assorbimento, appena sarà cessata l'infiammazione prendete subito una delle preparazioni mercuriali per bocca, nel modo che si prescriverà nell'art. Lue.

Se dietro l'uso de' mezzi esposti non rimanete guariti, o ne sorgessero altri inconvenienti, sarà un po difficile il potervi guarire da per voi: ricorrete al chirurgo (1).

Qualora il bubone fusse indolente, il più efficace rimedio per distruggerlo è il trattamento mercuriale. Fatevi quindi delle unzioni con picciola quantità di po-

⁽i) Poù la ciestrice ritardare per visio scrofoloso, scorbutico, o scabioso i in questi casi convicion servicio de rimedei analoghi, Poù la cute ripiegarsi all'intenno ed opporsi coa alla ciertria-sazione: biosogai nel rimocutor recidenda col ferro. Se ne venissero seni fistolosi, necessitano i trocisci di minio, o di ossidodi piombo. Poù finalmente sopraggiogervi la cangrena Questa al ferrana ordinariamente dopo è evacuorione della marcia, e gii emollicuit sono gli uniti rimedi locali d'adoptrazii. Del reato la cangrena d'oppedade, che appesa et complica ne bioloni esudevanti apporta spesso la morte. Nella circostana si converranno vitto raforante, rhima, oppio, acidi, medicature canforate, condicuito di china, col sucreo di limone, d'essema di trementina, il cambiamento della salae.

mata mercuriale in ciascuna volta tanto sul bubone, che nel interno della coscia: potete anche servirvi della unazioni di linimento ammoniacale, oppure degli empiastri di Vigo, di sapone, di diachilon, di cicuta, d'ammoniaca ec. E anche utilissimo il cataplasma di linseme spolverizzato col muriato d'ammoniaca ed inafiato di acetato di piombo liquido. Questo medesimo trattamento si conviene ai buboni che a' induriscono, Usando di questi rimedi siate nell'avvertimento, che se il bubone divenisse la sede di dolori lancinanti, converrà subito ricorrere agli emollienti, mentre tende sempre in tal circostanza all'esito della suppurzione.

CAPO VII and a lad at total and

e -- H o . - clabe towns

Dei porri, escrescenze, ed induramenti venerei

Alle malattie veneree locali si appartengono pure le varie duresse ed escrescenze che spesso si sviluppano nelle parti genitali di ambo i sessi non che nell'ano, Tante volte nasono in seguito di una malattia sifiitica universale, nè mancano degli esempi di essersi vedute sviluppare nel corso di una blennorragia anche nell'iorificio dell'ano, ove il solo deposito del materiala blennorragico è idoneo a produrvele.

Diverse denominazioni si son date a tali escrescenze secondo la figura, e loro grossezza. Così si dissero tubercoli essendo poco o nulla rilevate, da rendere però più o meno doloroso il coito. Condilomi si chiamano qualora sono grandi, appianati alla punta, e forniti come di un picciuolo, il di cui orlo libero è alquanto rotondo. Se sono più piecioli si dicono verruche, e porri le pieciolissime ed un po' lunghe. Del resto siffatti tumori si ebbero speciali denominazioni per distinguersi tra loro. Le denominazioni di creste, fichi, marische, timi , fragole, more, non esprimono che la semplice figura che tali secrescenze presentano. Le ragadi sono callose fenditure gementi materia che spesso nascono in mezzo di quelle escrescenze, e possono nelle vicinanze dell' ano divini fistolose.

Le nominate specie di escrescenze sono, d'ordinario, poco dolorose, e non di meno il loro color risulta più rosso del naturale. In certi luoghi son dotate di grandissima sensibilità, che si scorticano facilmente, tramandano da tutta la loro superficie certa materia mucosa fetida, diversamente acre, giallastra e presentano segui di grave infiammazione. Talvolta il trasudamento è rossastro ed anche sanguinolente.

D'altronde sia qual si voglia il grado d'irritatione presentato da tali escrescenze, sempre moleatano molto imalati nel camminare, nel cavalcare, e durante parechi atti della vita ordinaria. Quelle che risiedono nelle parti genitali formano, tanto pel proprio volumie, come pel grado di sensibilità morbosa che le accompagna, ostacoli talvolta insuperabili all'adempimento del coito; se sono poste all'orificio dell'ano, y rendono etiandio in qualche caso, perosissima l'evacuazione degli escrementi.

Per evitare qualunque errore nella cura di siffatte escrescenze, convien che facciate uso tanto de'rimedi csterni, che interni (1) quindi servitevi delle unzioni

⁽¹⁾ Hunter, e Girtanner rigettano del tutto la cura inter-

mercuriali, o di qualche preparazione salina od ossida mercuriale, siccome vi dirò nell'articolo della lue. Nel mentre farete uso del mercurio o preso per bocca, o per unzione, per secondare questa prima condizione, occupatevi del trattamento locale dei tumori. Se tali escrescenze, del pari che i loro contorni sieno di colore rosso-vivo, dolenti, infiammati, prima di far' altro, conviene moderare l'infiammazione coi fomenti, e colle applicazioni d'empiastri emollienti, cioè di malva, lattuga ec.; e se il dolore fusse intenso, prima di applicare quegli empiastri , ponetevi due o tre sanguisughe. Dissipati i segni infiammatori, convien praticare mattina e sera lievi unzioni locali con l'unguento mercuriale napolitano : potete servirvi pure delle bagnature spesso ripetute, con l'acqua di calce, o coll'acqua fagedenica, o col liquore di Wanswietenio diversamente allungato. Di raro le escrescenze resistono molto ad un trattamento così amministrato: in contrario sarete costretti ricorrere ad altri mezzi, alla recisione cioè, alla ligatura, alla consumazione coi caustici.

CAPO IX :

Della Ottalmia blennorragica

Non posso tacervi la storia di una malattia che ragionevolmente può far parte delle malattie sifilitiche locali, e che può sopraggiungervi nel corso di una bleunorragia, cioè a dire della ottalmia blennorragica.

na nella supposizione che sieno sempre malattie locali. Altri pensano il contrario.

Sotto di questo nome dovete intendere l'infiammazione di uno o dei due occlu cagionata dal deposito del materiale blennorragico avvenuto sopra tali organi (1).

Manifestasi comunemente tal male dopo la soppressione di'una blennorragia, quando questo scolo nun percorre regolarmente i suoi periodi : si osserva in entrame . Le cause ordinarie della ottalmia blennorragica sono: la rapida impressione del freddo, in particolare quando le parti genitali vi sono esposte, quella di una luee intensa e concentrata , la veglia prolungata, i gravi errori nella dieta, i colpi riportati sull' occhio, le nudate tie abituali di quest' organo, e la soppressione delle scolo blennorragico, ottenuto mediante le infezioni astringenti od i purganticircitanti. Talvolta la ottalinia è il risultato della diretta inoculazione, cioè a dire del toccamera to dell'occhio mediante un dito begnato di umor contagioso, o di qualunque altro corpo egualmente imprat-

Si annunzia la ottaluita blennorragica sin dal primo, o secondo giorno da un'i ligorgó roluminosissimo che formasi attorno la luce dell'occhio (2). Ben presto l'occhio istesso tramanda della màteria che 'diventa copio-

⁽¹⁾ Tale affeilone non devest minimamente conflitdere con la quella ciue chi e sempre douta ad anțiea catas venera e orstitusoniale, la di cui cuul fassi compre do mercurio ; ed i cogieto del i melito. ""

⁽²⁾ È un cercine considere ole formato dalla constantiva infisimmata administralia cornea trasparente, tumelaciono che non si rinviene nelle altre ottalune.

sa, viscosa, gialla o verdognola, a pari dello stesso scolamento delle parti sessuali : la sua acredine lascia tracce d'irritazione sulla pelle delle guance e del naso. Si gonfiano le palpebre (1), spesso si rovesciano, l'occhio non può più tollerar la luce, e la infiamniazione progredendo fa spesso delle suppurazioni nell'interno dell' occhio: possono in questo caso venirne mille scincerti; ed una inevitabile cecità, tien dietro al vuotamento degli umori dell'occhio. Questo funesto risultato accade qualche volta entro le ventiquattr' ore, di ordinario saltanto dopo quattro, o cinque giorni. In certi altri casi i sintomi sono moderati, la:ottalmia allora è mite (cronica) e puossi sperare di vincerla, prevenendo eziandio la disorganizzazione del globo dell'occhio. In condizioni non meno rare, gli accidenti del male dopo essersi appalesati per gravissimi, calmansi di repente col ritorno della blennorragia, o mediante la comparsa di un bubone all'inguine. In ogni caso gl'individui attaccati da questa specie di ottalmia hanno lo scolo blennorragico quasi sempre soppresso, oppure notevolmente diminuito.

La prima cura che dovete prendervi uel trattamento di tale affizzione, deve consistero nel procurar di richiamare la irritazione nell'ucetra tanto se il flusso blennorragico scomparve totalmente, quanto se scemò soltanto in una qualunque proporzione. Il mezzo più semplice per giungervi, si è l'introduzione variamente ri-

⁽¹⁾ Palpebra è nome dei due veli membranosi e mobili post d'avanti del globo dell'occhio, sotto delle sopracciglia, sopra delle guance, fra il naso e le tempia.

52 petuta nell'uretra delle candelette di gomma elastica . siccome vi ho detto per la cura dell'ingorgo dei testicoli. Alcuni medici la intingono dapprima in un poco della materia somministrata dall'occhio infiammato. Tarbes, antico professore di Chirurgia a Tolosa, è il primo che l'usò nel 1788; fu desso poscia imitato da Peralle della stessa Città, da Yvan, e da molti altri medici commendevolissimi. Colla mira di sollecitare il ritorno della morbosa secrezione nell'uretra, si possono altresì fare, ad esempio dello Scarpa, alcune infezioni alcaline in tale condutto.

In secondo luogo dovete usare il trattamento antiflogistico il più attivo: fatevi salassare subito dal piede ed abondantemente : le mignatte pure nell'ano, e nelle palpebre non vanno punto risparmiate : statevene nella perfetta oscurità : fatevi delle lavande negli occhi con decotti emollienti di malva , lattuga , solano , parietaria ec. non escluso il latte e qualunque altra sostanza con simile : ciò serve all' oggetto di portar via le materie muccose, il cui soggiorno aumenterebbe la infiaiumazione. Applicatevi un largo vessicante alla nuca; e fate uso delle bevande diluenti e nitrate come son prescritte nell'art. blennorragia, Del resto i bagni caldi , ed i pediluvi irritanti (1), compiono la medicatura richiesta da sì grave malattia.

-: Ad ultimare perfettamente la cura della ottalmia blennorragica è indispensabile l'amministrazione dei mer-

⁽¹⁾ Il pediluvio irritante si forma con acqua ben calda entro della quale si scioglie del sal comune, o vi si mescota della cenere, farina, senape polyerata ec.

euriali. Sia però qualunque il rimedio da scegliersi non dovute principiarne l'uso, se non quaudo l'inflammazione sarà quasi svanita. Diligentemente evitate poi la salivazione, nel modo che vi dirò più sotto, giacchè un tale accidente potendo riportare verso la testa certa irritazione, potrebbe rinnovare la ottalmia in esane,

Se distrutta l'infiammazione, persistesse del rossore nelle palpebre qualche macchia sull'occhio, convien che facciate uso di una delle appropriate pomate come quella di Dessault, di Janin, di Grandjean. Badate però che l'occhio non conservi molta sensibilità poichè le pomate potrebbero in questo caso nuocervi ansi che no.

I neonati ancora (permettetemi quest' ultimo paragrafo) spesso son colti do attalmia blemorragica cui contraggono immediatamente al momento del passaggio del
parto, mediante il contatto dell' occhio, con le parti imberute di uno scolamento contagioso. Si sviluppa
casa nella seconda settimana della sua nascita, e di rado attacca un sol' occhio: spesso cagiona la perdita della vista dell' occhio malato. La materia separata in questo caso è abondantissima; le palpebre sono molto gonfie e presentano nella loro superficie corto colore rossastro e livido.

La cura di questa afficione è all'incirca la stessa della già esposta; s'inissterà però ancora più ch' è possibile sulle cure di nettesta, al medesimo oggetto d'inpedire il soggiorno del materiale sull'occlào. Le esociate di sangue si dovran fare colle mignatte poste alle tempie, nelle vicinanze delle palpebre e sopra dei piedi. La nutrice si asseggettetà ben presto ad una cura mercuriale, e si avrà tutta l'attenzione per guarirla dalla malattia venerea dalla quale il bambino rimase contagiato: meglio sarebbe però che buona e sana nutrioe avesse ad allattare il bambino.

Eccovi la spiegazione delle principali malattie veneree locali. Le generali non si riducono che ad una sola, cioè a dire alla lue : vi parlerò ora di questa.

DELLA LUE VENERBA

Tutte le malatite di cui si è parlato, se presto non situatte coi rimedi dell'arte, inducono un contagio, una virulenza, un' infezione generale negli umori che chiamasi lue venerea, gallica, o celica.

Questa infezione nasce più di frequente dopo di un' ulcera venerea idiopatica a cui sia seguito un bubone, che dopo un' ulcera nata nell' uretra nel corso di una blennorragia: può venire in seguito ad altre escrescenze veneree; nè mancono degli esempi essersi veduta sopraggiungere ad una blennorragia.

Ordinariamente gl'indist dell'universale infessione principiano a manifestarsi sei o otto esttimane depo, in cui è verosimile che siasi fatto l'assorbimento del veleno negli umori: qualche volta anche più presto, e di rado più tardi di quest'epoca. Vi-è chi pretende che la lue sissi manifestata anche molti anni dopo dell' infesione (1).

⁽¹⁾ Ciò è stato da me osservato replicate volte.

Appena l'assorbimento si è fatto nella massa degli umori, un leggiero movimento febbrile fassi sentire, specialmente nelle persone sensibili. Passato un tempo più o meno lungo, il veleno venereo torna nuovamente a depositarsi sopra certe parti del corpo, producendovi ulcère; scoli, pustule ec. Le membrane che ricoprono l'interno della bocca, e del naso s'infiammano e si esulcerano: si manifestano pure altre esculcerazioni consecutive, pustule piane, escrescenze nelle parti genitali, e ne' contorni dell'ano: il male si trasporta nella pelle dove produce tubercoli, macchie raminer, la caduta de' capelli (alopecia) quella delle unghie : sa nascere un' infinito numero di furoncoli, ed altri tumori di diversa natura : sopraggiungono dolori notturni nella spessezza delle carni , flessioni permanenti delle membra . diverse ed elevate durezze sopra delle ossa, c queste medesinie, malgrado la loro durezza, trovansi attaccate, si gonfiano, suppurano, e si distruggono. Altre volte trasportasi l'umor contagioso sopra visceri di diversa importanza, e ne altera profondamente le funzioni : così depositato nell' ntero vi determina certi ingorgamenti che spesso diventano cancerosi : gittato nella membrana interna degli organi della voce e del respiro, vi occasiona l'afonia (mancanza di voce) la tisi laringea , o polmonaro: portatosi nella vessica urinaria vi fa nascere catarri cronici e disorganizzazioni profonde, sull' occhio vi produce la cataratta, ulcere, ed ogni sorta di cecità. Può depositarsi finalmente nel esevello: allora oh! che tristi effetti ne sopraggiungono! dolori violenti ed ostinati al capo, tremori e paralisi, emaciazione ed estrema debolezza, perdita de' movimenti o della sensibilità di uno, o de due lati del corpo: l'epilessia pure, ossia il mal caduco, diverse disposizioni all'apoplessia, l'apoplessia medesima, e la morte.

Ma quì non mi fermo a descriverri la lue sifilitica ; perchè essa si maschera in mille e diversi modi, perciò fa duopo che la sappiate conoscere per hatterla e distruggerla in qualsivoglia punto. D'altronde istruiti nella infinita enumerazione delle infermità che possono tener dietro alla sifilide, più attenti sarete e circospetti a ben dirigere le vostre cure dei mali venerei locali : non userete poi maggiore attenzione servendovi della venere?

I primi effetti prodotti dalla lue per solito si manifestano o alla pelle o alla parte posteriore della bocca, Nella prima si formano delle macchie ed esplosioni di diversa natura; nella seconda delle infiammazioni ed esulcerazioni.

Si distinguono le macchie della pelle indotte dalla lue, dal perchè esse hanno un colorito rosso-chiaro, ed oscuro; qualche volta giallastro come la ruggine del ferro. La sede loro è nel petto, nella faccia, nel dorso. Esse si innalzano sopra la pelle, si desquamano facendo distaccare la cuticola senza oagionar prurito, e nell'atto che sembrano guarito, nuovamente ritornano. Tornate per la seconda e per la terza volta ed anche dippiù giungono a formare una crosta la quale cadendo, è seguita da un'altra più estessa. Così tante volte si convertono in vere ulcere.

Se tali macchie si formano sotto delle unghie, vi à pericolo che queste sen cadano, e la nuova si riproduca sempre imperfettamente.

Le pustule pongono la loro sede in quelle parti del corpo ore esistono dei peli: quindi si veggono nella parte superiore della fronte, alle tempie, dietro le orecchie, nelle ascelle, e nelle parti pudende,

Le pustule s' innalzano per poce dalla superficie della pelle; hanno un colorito rosso, son dure, e suppurano nella loro estremità; disseccandosi, lasciano cadendo, una piccola macchia rosso giallognola, che tante volte si converte in ulcera. Intunto i peli, i capelli attaccati sin dalle loro radici cadono essi pure, nè si riproducono se non quando il veleno sarà in buona parte distrutto.

Quando la violenza degli effetti della lue si facesse sentire nella parte posteriore della bocca, allora nascono spesso delle ulcere dolorose; la declutizione vi rimane impedita, e l'infermo è obbligato di parlare col naso. Se desse non saranno arrestate ne' loro progressi, distruggono non solo le parti molli, ma anche le ossa del palato e del naso. Badate a non confondere queste ulcere, con quelle che diconsi scorbutiche. Riflettete a quanto vi dico onde non errare : le ulcere veneree della bocca si stabiliscono nella parte posteriore di essa (1), negli angoli delle labbra, nella lingua ec : le scorbutiche sempre nelle gengive. Quelle, ossia le veneree, hanno uu fondo bianco, alquanto duro, ed una figura rotonda; queste ossia le scorbutiche, hanno un colore giallognolo, e un poco livido, della carne fungosa, e gittano sangue appena si toccano.

⁽¹⁾ Nell'ugola, nelle tonsille, nel palato.

Spesso il male si limita agli esposti accidenti specialmente se il malato si faccia per tempo una cura conveniente: ma se ciò non si verificase sorgono delle malattie molto più ostinate, e difficili a guarirsi. I dolori delle ossa, i vari tumori che formansi su di esse, lo scirro, il cancro, altre disorganizzazioni degli organi, la sordaggine, le idropisie, le diverse malattie degli occhi e del cervello, non esclusa la tisi che più frequentemente toglie di vita il maggiore e miglior fiore della gioventi, sono le più funeste inaspettate conseguenze della lue venerca.

I dolori delle ossa più di frequente assalgono le persone affette dalla lue, e formano il segno più comune della stessa. Essi, nemici del giorno, si fan sentire principalmente nella notte, fissandori nella parte media delle ossa, singolarmente di quelle che sono più allo sooverto, che non 'sono cioè ravvolte da molte carni. Principiano al tramontar del sole, si rendono più intensi a misura che si giunge alla mezza -motte, e si dileguano a poco a poco al far del giorno (1). Con questi caratteri potete benissimo riconoscere i dolori venerei e saperli distinguere dai reumatici, i quali invadono più spesso le articolazioni, o si fissano nei muscoli, al contrario dei venerei che occupano la parte media di un'osso: i reu-

⁽¹⁾ Hi dolores magis offligunt nocte adveniente, et sentiuntur perinde ae si ossa frangantur et extendantur, cum quodam difficultate movendi membra voluntario. Montes.

discui totis diebus et noctibus omni sonno abacto caput dotet. Alii ineffabiles punctiones gravidinemque in scapulis sentiunt; cæteris in cubitis, genibus, vel corun teretibus; postreni in istis omnibus simul. Ili nec stare nec ingredi nec quidcumque operis humani perfecer possant. Grubeck.

Dal diverso modo con cui si manifestatuo più o meno chiaramente gli esposti fenomeni della lue, ne segue che la lue istessa debba distinguersi: 1. in lue manifesta se vien caratterizzata da sintomi chiari e non ce quivoci. 2. In occulta o latente se esiste nicl corpo senza dar segno di se (1). 3. In mascherata o larvata se mostrasi con segni insoliti, e differenti dagli ordinari. 4. In complicata se trovasi unita con altre malattie come collo scorbuto, colle serofole, colla podagra ce. 5. In raddoppiata animessa dal Better cioè a dire se ad una prima lue sifiltica ne segue un'altra.

Eccovi i principali caratteri della lue venerea: intanto siate accorti, e badi pure il medico a non precipitar subito subito un giudizio sulla vera esistenza di essa trattandosi di persone confugate, onde non si distrugga la pace di una famiglia, o resti infamata una persona innocente.

È un corollario che la lue venerea non venga mai guarita dalle sole forze della natura, e perciò vi ò serinpre bisogno del soccorso dell'arte: che essa per quanto più dimora nel corpo, per altrettanto sarà, più

⁽¹⁾ Poò riconoscersi la lue occulta dai seguenti segni st. da un ingrossumento del palato osseo che si fa diolorsos. Di suna ricorrente ancina. 3. Da una certa rigidezza nelle articolazioni. ¿ Da una sensibilità morbosa della resta come della Jaringe, dei deut cc. 5. Se questi inconedi svaniscono sotto una stagione calda e vita regolare, e ritornamo in circostanno opposto.

difficile ad allontanarvela: che sia più facile a distruggersi nelle persone di mezzana età, che nei vecchi e nei bambini; che il mercurio sia il sovrano rimedio per vincersi, e che qualora resista all'azione di queste rimedio, si vede ostinare anche sotto l'azione di altri.

Il mercurio, mercurius, hydrargyrium, argentum vivum (metallo riposto nella prima sezione di Thenard) è stato adoprato in Europa sin dall'anno 1498 per combattere le malattie venerce. Questo tanto buon rimedie si è usato diversamente. Nel principio si ungevano gl' infermi da capo a piedi, una o due volte al giorno per tutto il corpo coll' unguento mercuriale : indi ponevansi in un gran letto di piume, riscaldandosi a quel ch'era possibile la sua stanza. Questo trattamento doveva continuarsi almeno per un mese durante il qual tempo non era permesso al paziente di sortire dalla sua stanza neppure per una volta. Con questa cura che dicevasi evacuante pensavasi di espellere con la massima certezza il voleno venereo per mezzo della salivazione. Ma dovendo oredere al Cavaliere Hutten da lui stesso sofferta una tal cura, appena la centesima parte degl' infermi veniva alleviata, e niuno persettamente risanato.

Fu inventato un secondo metodo per guarire la lue che costituiva la cura per salivazione, metodo per molto tempo adottato negli ospetali di Francia e d'Inghilterra. Con questo facerasi salivare l'infermo per alcune settimano mediante le replicate unisoni di mercurio dando pure il calomelano internamente. Ma questo ancora decadde, como egual sorte incontrarono il metodo per istinzione di Chinoyneau, quello di Dessault per derivazione, quello delle fumigazioni sostenuto da Alouette, quello pure

dell'assorbimento raccomandato da Clare e lodato da Cruickshank, siccome lo fu il metodo per clistei e per bagni mercuriali.

Al presente amministrasi il mercurio internamente ed esternamente : all' esterno s' impiega in fregagioni cutance apento prima in qualche corpo grasso, nella dose di merza ad una dramma ogni quarantott' ore, vale a dire da una a due dramme d'unguento apolitano, che applicasi nella faccia interna delle membra. Un tale trattamento deve venir secondato dall' usò dei bagni, da sobria regola di vivere, e dalle convenienti precuurioni per preservarsi dagl' influssi atmosferici quali potrebbero modificare svantaggiosamente le funsioni della pelle. Potete prescrivervelo pure alla dose della metà sotto la forma di proto-cloruro parimenti mescolato con qualche corpo grasso; come pure sotto quella di deuto-cloruro (sublimate corrosivo) ed in quest' ultimo caso conviene applicarlo soltanto alla pianta dei piedi.

Nel nostro clima si fa maggior' uso del mercurio impiegato internamente: voi scogliete quindi un tal partito. All'interno s'impiega il mercurio nello stato di deuto-cloruro sotto forma pillolaro, e nella dose della
decima od ottava parte di un granello al giorno: si usa
pure in dissoluzione acquea, ciò che forma il liquore di
Van-Swieten. Il proto-cloruro però ossia calomelano
può prendersi sino a 5, o 6 granelli in ogni a 4 ore tento
in pol'erre come in pillole. Amministrasi il mercurio
nello stesso modo e nelle stesse dosi come il sublimato
quando trovasi unito al cianogeno, cioò nella condisione di cianuro di mercurio; sescolato al iodio, ossia
proto o deuto-ioduro di mercurio; ve lo potete pre-

S'impiegano pure contro la sifilide i legni detti sudoriferi come la falisapariglia, il guaduco, la china
molle e sassafras tanto in decotti, come sotto forma di
sciroppi, rob, od estratti diversamente ristretti, e
talvolta anche in polvere. Veramente i primi due soltanto sono efficaci. Auministransi i sudoriferi a seconda
della specie, del grado ed antichità dell'infecione, e
della natura degli antecedanti trattamenti, 10 soli o accompagnati dal mercurio. Se la lue è antiquata, ed ha
posto, dirò così, profonde radici, quei legni non bastano isolatmente a distruggeria.

mo varie ricette nelle quali troverete stabilita la dose

delle diverse preparazioni mercuriali.

Telvolta impiegasi pure contro la lue venerea l'oro ed il platino: ma ad onta che del primo sissi, voluto farne infallibile panacea contro ogni sintoma indotto da tal malattia, pur non si conoscono casi ben determinati in cui anticipatamente calcolar si possa sulla loro efficacia. Ma pon basta conoscere l'essta nomenclatura dei rimedì antivenerei: esser dee vostra mira, come del medico, il farne l'applicazione meglio conveniente alle diverse specie d'infezioni, e non essendo questa la cosa men difficile a disimpegnarsi, secondo ho promesso negli, articoli precedenti, y engo a tale particolarità.

Tutte le malatie siflitiche primitive, dorete combatterle coll'uso del mercurio dopo aver calmuti i fenomeni inflammatori siccome è stato detto. Quindi nel caso di blenporragia siflitica, oleere, o pustule primitive serviteti del proto elevuro di mercurio ; ossia mercurio doloe nella dose di cinque o sei granelli al giorno: o delle pitlote turchine detta Farmacopea di Londra due al giorno: o dell'etiope minerale alla dose di sei oppure otto granelli al giorno; è continuatene il loro uso per quindici giorni almeno, e non oltre un mese.

In tutti i casi d'infezione secondariá, vale a dire quelli in cui i sintomi, come il ritormo delle ulcere buboni, pustule ce, nel luoghi che avevano occupato, si sviluppano soltanto uno, due, o tre mesi dopo la guarigione de primitivi accidenti, si farà maggior calcolo sopra I suo delle unsioni mercuriali, o del sublimato in pillole, od in liquore, e si dovià prolungare il trattamento per lo meno un mese e mezzo, e come ausiliari del mercurio userete o la tisana di orro, o di radice di bardana, o due o tre bagni alla settimana.

Ma trattandosi di sifilide consecutiva, e sommamente constituzionale che sopravvenga uno o più anni dopo alcuni segni primitivi o secondari d'infezione trascurati del tutto o mal curati, siate prudenti a combinare l'uso dei mercuriali teste indicati, con quello dei decotti sudo164 diferio di si faranno tanto più ristretti, quanto più antica sarà la malattia ed avrà già deluso molti trattamenti. Allora prescrivetevi gli sciroppi, i roli e gli estratti di salspariglia, semplici o diversamente composti, coll'aggiunta del gnataco, o di altri sudoriferi, Tali cure continuatele almeno per due mesi e spesso ancora per tre.

Finalmente se la malattia resistito avesse a molti trattamenti, tanto coi mercuriali soli, come cogli stessi rimedi accompagnati ai sudoriferi, siccome poco buone speranze sarebbonvi calcando le stesse vie, vale assai meglio che rinunciate esclusivamente alle preparazioni mercuriali, ed attenervi invece alle tisane sudorifiche ben ristrette a cui aggiungerete il solfuro d'ansimonio, come alle tisane di Feltz, Vigaroux, a quella detta di Lisbona, non che al rimedio d'Arnoux, all'acqua di Pollini ec. All'uopo prenderete una o due libbre di queste al giorno con 12, o 20 gcanelli di solfuro d'antimonio (1).

⁽i) È fratto di lunga esperienza che l'existenza di pustule od ulcrer del lango all'adoisone del mercurio ridotto in vapori applicato sotto forma di bagoi, o meglio ancora in unzioni. Che le malstrie dell'osse cadona o preferenza sotto l'azione del deuto-cloraro in soluzione soques, che di altra preparzione. Che li tritzione troppo perseverante della gola e l'dolor di capo notturno del pari ostitatto, spesso sono gastiti dal carerio.

Goloro che son disposti a delle erusioni crisipelatose debiono critare le usioni mecuriali; al contrario degli altri che andando incontro a delle Irritazioni oli Inflammazioni intestisali vi debbono aver ricorso certa irritazione del bronchi prolibre l'uso del sublimato, mentre gl'inporgamenti imfatici indolenti lo richieggono a preferenza.

Della salivazione

Spesso facendo uso del mercurio può sopraggiungervi la ralivazione (1) la quale consiste in una secrezione di saliva eccedente di molto lo stato ordinario, associata ad una profonda irritazione degli organi destinati a produrla. Affetti da tal malattia potete anche voi stessi dirigervi la cura nel modo che son per dirri. Eccovi quindi una breve descrizione della attivazione mercuriate.

Si annunzia-la salivazione con certo calore insolito, lieve dolore, ed un principio di tunnefazione alle gengive, le quali diventano di color rosso-pallido, la lingua s'insucida, il palato risente un certo sapor metalico, el'alito diviene somunamente fetido affatto particolare ai casi ne'quali sussi del mercurio. Al sentirvi tali sconcerti, rinunciate presto all'uso del mercurio, in caso contrario la tumefazione nelle gengive aumenta rapidamente, stendesi sino all'interno delle guance ed auche alla lingua (3) il cui volume diviene talvolta così bonsiderevole da fuoriuscire dalla arcate dentarie. In questo caso più copiosa si rende la scorezione della saliva

Qualle malattie voneree contro delle quali si feer il trattamento colle unioni inutilmente, saranno poi generalmente meglio combattare rolla soluzione di Van-Swieten; che la non riaserta del proto-clorro di mercurio indare dee a sostituirgii il mercurio di Plench che uni casi one l'acetto di mercurio ritusei infrattasso, è prudente di prescrivere il solfuro od ilioduro di mercurio, e viceversa.

La salivazione salivatio è detta pure ptialismo ptyalismus dal greco ptio sputare.

⁽a) Le glandole sotto mascellari, le parotidi partecipano ancora di un tal gondiore.

la quale si fa chiara, e di pessimo odore: le gengivo gettan sangue ad ogni lieve pressione; la lingua e gli stessi denti covronsi di denso strato di velo gialistro esalando insoffiibile fetore. Se ad onta di tutte le curre, il male continua a progredire, l'enfagione della bocca si aumenta a tal segno che la masticazione, la declutizione e la loquela rimangono impedite. In ultimo la membrana che ricovre le guance, le gengive, e la lingua, si seulecra in vari punti, e la quantità della saliva che fluisce dalla bocca, che si tiene quasi seupre aperta, arriva sino alle quattro o cinque libbre nello sapaio di ventiquatti ore.

Pria che vi parli del trattamento curativo della salivazione, è duopo che vi renda istruiti del come tale inconveniente debba evitarsi nel tempo che prenderete il mercurio, mentre il più sicuro rimedio per questo male sta nel prevenirlo.

Poste prevenire la salivazione regolando prudestemente le dosi del mercurio ginsta la sensibilità vostra, vale a dire principiando da picciolissime quantità, che aumenterete quindi in modo lento e progressivo sino alla tolleranza. Se durante siffatto principio, che si è, per così dire, il tempo di esplorazione, profonda inritazione vi sorgesse nella hocca, sospendete subito l'uso del mercurio, riserbandovi di riprenderlo più tardi, ma in nimor dose.

Prendendo un purgante ogni sette od otto giorni durante la cura mercuriale, vi preserverete pure dallo ptialismo: coà egualmente non risentirete i danni di un tal male, facendori dei gargarismi col decotto di china, colle radici di ratania, coll'aceto ce. A fin di rinQualora o non aveste ritratto vantaggio dai surriferiti mezzi, o non avendo mata vernna precauzione, i lo ptialismo si fusse già dichiarato, servitevi nel rincontro di questi rimedi.

 Sospendete subito l'uso del mercurio, e se per disgrazia fuste in unione di altri nella stessa sala uscltene presto e cercate un'aria libera e ventilata. Contemporanamente rinnovatevi spesso le bianoberie.

a. Prescrivetevi una tisana, di orzo per esempio, adulcherata, oppure un' emulsione di mandorle acidulata col succo di limone, o con otto o dieci gocce di acido solforico per ogni buccale.

d.3. Aglte diretamente sopra le parti ammorbate coi gargarismi emollienti di malva ; lattaga e cose simili, ne quali farete sciogliere due o tre granelli d'estratet d'oppio per ogni libbra, cui sostituirete verso il declinare della irritazione i decotti astringenti fatti o di china, e di ratania, o di concla e simili.

4. Ponetevi sei od otto sanguisnghe attorno la maseella sempre che il calore sia insoffribile.

5. Ogni tre o quattro giorni fate uso di un purganto.
6. Tutti questi mezzi secondateli con begni caldi gomerali, o pediluvi.

7. Fate pure uso dei vessicanti nelle braccia se la salivazione si prolungasse con molta forza.

Bramate un pià sollecito e sicura-rimedio contro la salivazione mercuriale la più ostinata? Questo vi vich dato da Brachet di Lione ed è l'acetato di piombo o zucchero di saturno. Un tal rimedio deve darsi nella dose di un granello, mattina e sera; ed in pillole. Mercè di questo mezzo, dice l'autore, la salivazione cecte bruscamente e radioalmente in men di due giorni.

Preservativi della sifilide

Nella certezza che tutti, niuno esclaso, bramate il modo di preservarvi da un male tanto micidiale e crudele, credo opportuno all'oggetto serivervi un ultimo articolo.

Dal momento in cui potè corrirai che il mal venoreo comunicavasi per mezzo del coito, si cureò preservarsene mediante alcune precauzioni. Vindelfinia;
Hock, ed Almenar nei primi anni del secolo XVI,
surono di avviso che il miglior mezzo profisticò della
conlagione consisteva nell' evitare le occasioni di abbandonarsi alla lussuria. Questa saggia raccoimandazione, non giudicata opportuna, perchè poche persorie
sembravan capaci di serbare continenza, i si provavono
ben presto una quantità di metodi tendenti tutti allo
stesso scopo.

Brassavola e Boerhaave, contentavansi preserivere di Javarsi accuratamente con acqua fredda appena eessato l'atto, ciocchò dicendo il vero, non è forse il meuo efficace rimedio da impiegarsi all'oggetto. Non limitandosi a ciò, altri autori raccomandarono le lozioni con infuso di sostanze aromatiche od astringenti nell'acqua o nel vino; altri prescrissero di farle coi soli acidi come aceto, e limone, Alessandro Petronio però, e poscia Harrisson pretesero che bastasse lavarsi colla propria urina subito dopo il coito, mezzo che può tornar vantaggioso se il contatto non fu prolungato di troppo. Pevrille prescriveva le lozioni coll'ammoniaca disciolta nell' acqua . mode già prima di lui adottato in vari luoghi dell' Europa : in seguito vi fu chi lodò le lavaude ed anche le infezioni con acqua di calce fresca; la soluzione di sublimato, l'acqua fagedenica, quella di Goulard , o poco Colomelano stemprato colla saliva, llunter colla scorta di Fordyce raccomandava certa soluzione di potassa tanto allungata da non produrre nella lingua che un sapore leggermente stitico. Venne pure consigliato di fare sulla parte esposta al contatto alcune embrocazioni con l'olio, sugna, cerotto, unguento mercuriale, ed altri corpi grassi, affin di turare gli orificî assorbenti delle parti naturali. S' impiegarono pure le infezioni aleose, saline, alcaline o mercuriali : varî sapoui di diversa consistenza furono pure adoprati, e gli empirici di ovunque hanno distribuito, e distribuiscono pure prodigiosa quantità di rimedi d'ogni forma a cui attribuiscono la bramata efficacia : si giunse per fino a persuadersi che l'applicazione di un piccione o d'una rana spaccata in due sulla parte anteriore del pube subito dopo la coabitazione sospetta, agir dovea qual sicuro preservativo.

Il poco buon esito di tutte queste pratiche calcolato dal tempo e dall'esperienza, suggerì un' invenzione che consiste nel covrire il membro virile di certo invoglio fatto coll'appendice eccale dell'intestino di certi animali , o colla vessica di agnellino in prima disseccate e rese quindi manegevoli col fregamento di certo miscuglio di crusca e poco d' olio di mandorle dolci. Tal meccanico mezzo, oggid) generalmente in uso, sarebbe incontrastabilmente il più efficace di qualunque altro, se il sacco di cui si parla si conservasse sempre intatto; ma spesso invece succede che si fora, per cui presta dubbia sicurezza. Lascia d'altronde e la borsa, e la regione del pube esposte al contagio; e perchè può rimuoversì pure nell'atto venereo, anche per questa ragione non preserva mai sicuramente dal contagio. Del resto questo mezzo può inspirarvi fiducia quante volte il suo uso vien secondato da lozioni accuratamente fatte (sia qualunque delle nominate), non che dall'attenzione di urinar subito dopo l'atto, e particolarmente dal non restare a lungo in contatto colle parti dalle quali si potesse temere il contagio.

Eccovi quanto ho potuto brevennente narrarvi sulla storia delle diverse malattie sifilitiche, e del come voi stessi ve le possiste guarire. Fortunato tra voi chi in mezzo alla disavventura ed alla vergogna del procurato male, può risanare I Ma più fortunato assaì per tutte le rafioni chi segue il consiglio del poeta :

Parce tamen Veneri, mollesque aute omniu vita Concubitus: nihil est nocuum magis: odit et ipsa Pulchra Venus, taneræ contagem odere puellæ.

(Fracust. lib. 2)

ELENCO DE' RIMEDI

PER

LE DIVERSE MALATTIE VENEREE

T

Pel primo stadio della blennorragia Nitro puro dramma una Emulsione di mandorle dolci once 8. Sciroppo di viole once due, mes: Prendetene un cucch: sgni due ore.

Solfato di stillata once dieci
Estratto di Saturno gocceventi, mes:
Con quest' acqua fatevi 5, o 6 siringhe al giorno.

и.

Pel secondo stadio della blennorragia Emutsione di mandorle dolci once 8. Tint. d'oppio semplice seropelo 1. Sciroppo oppiato oneia una, mes: Prendetene un cuech: ogni tre ore.

Acqua di rose libbra mezza
Solfato di zinco granelli dieci
Laudano liquido dramma mez: mes:
Fateri lulle siringle come sopra.

Per l'ingorgo de testicoli

Essendo delorcio qua resista

72

Empiastro di malva o lattuga inaffiato con 30, o 40 gocce di laudano liquido, o con once due d'acqua di lauro ceraso. Ponetelo sulla borsa, rinnovandolo ogni due ore.

Siero di latte libbra una Nitro puro dramma una, mes: Prendetene un cucch: ogni ora.

Essendosi reso indolente

Acqua di Goulard libbra una.

Fatevi delle bagnature sulla borsa:

persistendo la irritazione introducetevi la candeletta nell'uretra.

IV.
Per il fimosi, e parafimosi
Essendo dolorosi
Mignatte num: otto.
Applicatele al perineo.

Empiastro di malva, o lattuga. Mettetelo sul prepuzio e rinnovatelo spesso spesso, ponendovi prima un poco di pomata mercuriale.

Latte tiepido libbra mezza.

Fatene infezioni tra il prepuzio ed il glande.

Essendo indolenti

Acqua di Goulard, o di calce lib:

una.

L' yeart Vannigation ite mil

Fatevi coll' una , o coll' altra de' bagnuoli.

lotte di gomesa ultattet.

Sanguisughe num. 10.

Da porsi al pube, ó al perineo.

Empiastro emolliente.

Bagno tiepido generale. Da replicarsi più volte.

Operazione cerusica: cateterismo.

22 11 12

Acqua distillata lib: una

Dimensin Gangle

Per uso di siringa in replicate volto al giorno.

VII.

Per la cronica incordatura del pene Linimento mercuriale once due. Fatevi delle unzioni sul membro.

VIII. .

Per gli stringimenti uretrali Vedi il num. 5.

Il miglior rimedio sta nell'introduzione per l'uretra delle candelette di gomma elastica.

> Per le ulcere veneree Essendo infiammate

Decotto di malva, o di lattuga, o de' semi di lino lib: una. : Fatevi de' bagnuoli sulla parte.

Non essendovi l'infiammazione

Occhi di granchi, e mercurio

dolce egual dose granelli 20,
fa cartina.../

Fatene cadere tanto sull'ulcera per quanto basta a covrirla leggermente, ponendovi dopo delle filaccia.

n 1 1

Pel bubone venereo

Essendo infiammato

Mignatte puin: dieci.

Applicatele attorno al tumore, e replicatene l'applicazione.

Empiastro emolliente. Ponetelo sul bubone rinnovandolo spesso.

Siero di latte lib: una e mezza.
Si prenda nel corso della giornata.

Essendo indolente

Pomata mercuriale oncia mezza.
Fatevi delle unzioni tanto sul bubone, che nell'interno della coscia corrispondente, il file sini

XI.

Pei porri, escrescenze, ed induramenti venerei essendo infiammati Mignatte num: tre.

Applicatele attorno dei tumori del tumori rinnovandolo spesso spesso con di tumori rinnovandolo spesso spesso con di

michilique are an enter in culture I Dissipata l'inflammazione Acqua fagedonica dibrima crussosti.
Fateri, delle hagoature, l'acciando les antipezze begeate, spose tali tumori.

THE NAME OF THE PARTY OF

Candelette di gomma elastica di

Se ne adatti una all' apertura dell'uretra e bagnata di umor contaggioso vi s' introduca:

Salasso dal piede di una libbra di sangue.

Mignatte num: 4, o 5. Nelle vicinanze delle palpebre.

Latte tiepido lib: una
Fatevi delle bagnature sulf occhio
e prendetevi delle bevande come al num; 1.

RIMEDI CONTRO DELLA LUE

Mercurio dolce granelli r.
Estratto di dulcamara quanto basta a far pillola.

Etiope minerale granelli viij.
Estratto di salsa gr. x11. fa pillola:

Mercurio solubile di Hanhemann gr. j.
Polv. di radice di liquerizia dramma mezza, messe fa cartina

(1) Queste ricette debbono spedirsi ogni giorno.

Specifico di Plumer gr. v.

Resina di legno santo gr. viii.

Estratto di dulcamara gr. x, fa pill:

Mercurio gommoso di Plenck.gr. oj.
Polv. di salsa dramma mezza, f. c.

an VI. s lab and

Precipitato bianco un quarto di gri Oppio puro granello mezzo, f. pill.

Panacea cinnab: di Thompson gr. v.
Estratto d'aconito nappello gr.
mezzo, f. pill.

Queste due valgono essendovi dei dolori.

XIII.

Deuto fosfato di mercurio la decima parte di un grano Estratto di camomilla quanto basta a far pillola.

IX.

Sublimato corrosivo la decima parte di un grano.

Acqua distillata once due
Sciroppo semplice oncia una, mes:
Vale nelle piaghe di gola, cruzioni

cutanee ec.

Polv. di regolizia gr. v. f. pillola. È stato prescritto nelle malattie che han resistito al merciario, nelle piaghe cancerigne della lingua cc. XI.

Rob nella dore di uno, due , o tre cuceh: bevendo poi 5, o 6 once del seguente decotto:

Rasura del legno gualaco oncia una Salsa pariglia inoisa dranne due fa decotto di libbra mesta.

Solfuro d'antimonio gr. xr.. Vi si soprabbeva mezza libbia del decotto del Pollino.

The second section is a second second

VAI 1538833

INDICE

the state of the s					
PARFAZIONE.	3				
Brevi notizie sull'origine del mal venereo	5				
Mezzi pei quali il mal venereo si comunica	8				
CAP. I. Della scolazione	10				
Della scolazione delle donne	16				
CAP. II. Malattie prodotte dalla scolazione	19				
SEL. I. Ingorgo dei testicoli.	20				
Szz. II. Del fimosi	22				
Sez. III. Parafimosi.	24				
Sez. IV. Iscuria Venerea	25				
CAP. III. Della blennorrea	27				
CAP. IV. Incomodi residui dopo la blennorrea					
SEZ. I. Cronica incordatura del membro	ivi				
SEE. II. Stringimenti uretrali	32				
CAP. V. Delle ulcere veneree	35				
CAP. VI. Bubone venereo	40				
CAP. VII. Dei porri, escrescense, ed induramenti venerei .	47				
CAP. VIII Della Ottalmia blennorragica	49				
Della lue venerea	54				
Della salivazione	65				
Preservativi contro la sifilide	68				
Elenco de' rimedi per le diverse malattie veneree.	71				
Elenco de rimedi contro la lue	76				
Elenco de rimedi contro la lue	10				

RRORI - CORBEZIONI

pag	. ver		
5	15	ri	si,
	21	Borrahave	Boerhaave
8.	13	Che si coisce	
9	9	qulle	quelle
13	3	decoti	decotti
,,	8	libre	libbre
1.6	26	Valgano	Valgono
15	11	mandolre	mandorle
,,	44	libra	libbra
18	8	libra	libbra
	27	supprimersi	sopprimersi
24	7	dalle	dalla
27	ıñ.	E	Ė
31	- 22	perinco	perineo
	6	qui	quì
34 35	12	è	e e
36	18	dalla	della
36	2	dalla	della
39	30		Hahnemann
	31	Secendo	Secondo
40		propostoci	
-	9	da-	propostomi dal-
22	10		
41	29	E piegatura.	la piegatura
42			C. C. THUE
49	31	Capo IX	Capo VIII
53	31	asseggetterà :	assoggettera
54	17	mancono.	mancano
58	26	quodam -	quadam
"	79	franguntur,	frangantur (
* 11	29	aliqui	alicui (1)
62	1.7	falsapariglia	səlsəpariglia
64	5	gnaiaco	guaiaco
_	. –		-

⁽i) Questi due errori si trovano in poche copie.